

成
方
切
用

序

內經醫之奧旨也。諸方醫之粗迹也。近代時醫相率以方授受。而求經論者無之。舍奧旨而務粗迹。安望其術之神良乎。雖然方亦何可廢也。方以立法。法以制宜。譬之工倕。匠心獨創。斷未有倂規矩而爲之者。特神而明之存乎其人焉耳。古昔方書得人。乃傳扁鵲倉公。皆稱禁方。秘不輕授。所以漢時以前。成方絕少。而仲景爲方之祖也。仲景以後。方書充棟。無如製方者日益多。而註方者不少。槩

見宋成無已始將仲景一百十三方論而註之。使觀者知其端緒。漸得解會。但循文訓釋。仲景之良法精義。不能盡徹。迄明興。始有吳鶴臯之醫方考。因病分門。詞旨明爽。海內盛行。但搜採不無闕略。近日汪訥菴倣成氏吳氏之意。而擴充之。採輯古方。名曰集解。先詳受病之由。次解用藥之意。碩論名言。採搜甚富。然不能無承訛襲愆之說。且于新方。摠未採錄。均未可以語全書也。洛不揣愚陋。取吳氏汪氏所輯而增改之。得古今良方。凡一千三

百餘首。稟諸經以觀其合。訂之證以發其微。編爲十四卷。題其端曰成方切用。以所錄皆取切于時用之方。而尤期用方者之切于病情也。何則。邇來風氣寢薄。人之稟受。遠不及古。故方有宜古不宜今者。設起仲景于今日。將必有審機察變。損益無已者。而謂錄方可不切于時用乎。且病有標本先後。治有緩急。逆從。醫貴通變。藥在合宜。苟執一定之方。以應無窮之證。未免實實虛虛。損不足而益有餘。反致殺人者多矣。用方之切于病。豈易易哉。

然則如之何而後可曰研窮乎靈樞素問而經義無不通也詳求夫望聞問切而證因莫能遁也深悉于氣味陰陽而藥性剖其微也夫然後經之以法緯之以方從斯集而合離變化焉自迎刃而中其肯綮矣

乾隆辛巳中冬月長至日漱水吳儀洛遵程書於硤川之利濟堂

凡例

一古人因病立方。加減出入。俱有深意。若不明其
受病之由。與用方之所以能治其病之故。而槩
執方以治之。其不至于悞世殃人者幾希。茲集
病情方意。互相闡發。庶便資用。若每方皆釋。則
重複煩瑣。反生厭瀆。故前後間見。詳略不一。或
釋制方之意。或擬加減之法。讀者彙觀而統會
之可也。

一。人身一小天地也。當天地初開。氣化濃密。則受

氣常強。及其久也。氣化漸薄。則受氣常弱。嘗考五帝之壽。咸踰百歲。三王之後。及百者鮮矣。故東漢之世。仲景處方。輒以兩計。宋元而後。東垣丹溪。不過錢計而已。豈非深明造化。與時偕行者。與今去宋元又遠。元氣轉薄。所以臨證施治。多事調養。專防尅伐。多事溫補。痛戒寒涼。此今時治法之變通也。若執成方。或矜家秘。惟知盡劑。不顧本元。惟知古法。不審時宜。則輕病卽重。重病卽死矣。有利濟之心者。宜加戰兢焉。

一成無已所註仲景之方不過循文訓釋而已近
世如方中行喻嘉言周揚俊輩于仲景傷寒論
俱有發明而喻氏尤能闡發其精義故本集採
錄獨多

一吳鶴臯之醫方考門分七十則嫌其多方凡七
百首每證不過數方則嫌其少如五積散逍遙
散皆不入選不無闕略近日汪詡菴醫方集解
門分二十有一正方三百有奇附方之數過之
但專錄古方未及新方茲集門分二十有六古

方新方共一千三百餘首似已足盡醫療之法其有未備學者其神明而推廣之比例而善用之則得矣

一集中所分門類醫學始于靈素故首列內經之方而人之由生全賴夫氣故先治氣血者所以配氣故次理血今人血氣虧者甚多故次補養而大虛者防滑脫故次瀉固及受病則有汗吐下三法故次發表涌吐攻裏又有宜緩攻者故次消導若病在半表半裏法當和解故次和解

又有表證未除裏證又急者當表裏交治故次
表裏而受病之因多起於六淫故次風寒暑溼
燥火而病有因痰者故次除痰有因蟲者故次
殺蟲至于婦人小兒癰瘍眼目各有顓科茲集
欲便于用故每科略取數方以備採擇又錄救
急之方以應倉卒末附勿藥元詮以爲衛生之
方使人知病有勿藥之治真有方而具無方之
妙已

一本集方名用一病證用△精義要義用○○○

一拙刻第三種本草從新刊布已數年矣。今復出此集相輔而行。其間多有互相發明者。
一拙著醫學第五種傷寒分經第六種雜證條律等書。俱嗣刻問世。

吳氏醫學述第四種成方切用總目

卷首

內經一十二方

附一十一方

卷一上

治氣門共四十方

卷一下

理血門共五十五方

卷二上

補養門共八十七方

卷二下

濇固門共二十八方

卷三上

表散門共六十三方

卷三下

涌吐門共二十四方

卷四上

攻下門共三十八方

卷四下

消導門共五十二方

卷五上

和解門共四十八方

卷五下

表裏門共二十方

卷六上

祛風門共八十三方

卷六下

祛寒門共九十三方

卷七上

消暑門共四十四方

卷七下

燥溼門共五十五方

卷八上

潤燥門共三十五方

卷八下

瀉火門共一百零一方

卷九上

除痰門共五十方

卷九下

殺蟲門共一十方

卷十上

經帶門共二十九方

卷十下

胎產門共五十七方

卷十一上

嬰孩門共五十四方

卷十一下

癰瘍門共三十三方

卷十二上

眼目門共二十五方

卷十二下

救急門共五十三方

卷末

勿藥元詮共七十四條

方制總義

靈樞刺節真邪篇曰真氣者所受於天與穀氣并

而充身也真氣即元氣也人稟陰陽五行以生氣

之真氣必與後天所受於天之氣合而後充於天

身然後得氣以運行而不息焉是故上有膻中之氣

所以通呼吸而統攝諸氣以主一身之治節者也

此其運布在肺中有水穀之氣所以養營衛者也此其

轉輸而在脾胃下焦有丹田之氣所以為三焦之本者也

此其藏納在腎氣聚則生氣散則死醫欲活人當

素問疏五過論曰治病之道氣內為寶循求其理

方制總義

求之不得過在表裏

凡治病者常先於元氣之在

其過之何有而為理治唯求元氣之病而無所得

然後察其過之在表在裏以治之斯無誤也。按

氣有外氣大則六淫之外邪毫內氣人身之元氣也

唯元氣充實則六淫之外邪毫內氣不敢犯故人之元氣也

賴唯斯而已即如本篇始末所言及終始等篇皆

倦倦以精氣重虛為念先聖惜人元氣至意於此

可見

素問陰陽應象大論曰陰陽者天地之道也萬物

之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也治

病必求其本萬事萬變皆本陰陽而病機論治為

以陰或本於陽知病所由生而直取之乃為善治所

氣標

病而生寒熱者。但治其所生之本原。則後生諸病
不治自愈。所以得陰脉而見陽證者。本陰標陽也。
不得陽脉而見陰證者。本陽標陰也。若更治其標而
不治其本。則死矣。○百病多生於六氣之別。則
有生於標者。有生于中氣者。太陽寒水。本寒標熱。
少陰君火。本熱標寒。其治或從本。或從標。審寒熱
而異施也。少陽相火。從火化。為本。不從少陽太陰
化。為本。其治但從火濕之本。不從少陽太陰之標。
也。陽明燥金。從燥化。燥為本。陽明為標。厥陰風
木。從風化。風為本。厥陰為標。其治不從標本。而
從乎中。中者。中見之氣也。蓋陽明與太陰為表裏。
其氣互通於中。故燥金從濕土之中。氣為治。厥陰
與少陽為表裏。其氣互通於中。故風木從相火之
中。氣為治。亦以二經標本之氣不合。故從中見之
氣。以定治法。若太陽少陰。亦互為中見之氣者。然
其或寒或熱。標本甚明。可以不求之於中。雨至諸
病皆治其本。惟中滿與大小便不通。治其標。蓋中
滿。則藥食之氣不能行。而臟腑皆失所稟。故無暇

治其本。先治其標。二便不通。乃危急之候。諸病之
急。無急於此。故亦先治之。舍此則無有治標者矣。
至於病氣之標本。又自不同。病發而有餘。必累及
他臟。他氣先治其本。不使得入他臟。他氣為善。病
發而不足。必受他臟。他氣之累。先治其標。不使累
及本臟。本氣為善也。凡病有標本。更有似標之
本。以本之標。若不明辨陰陽逆從。指標為本。指本
為標。指似標者為標。似本者為本。迷亂經常。倒施
針藥。後人如麻矣。

素問至真要大論。帝曰。氣有多少。病有盛衰。治有
緩急。方有大小。願聞其約。奈何。五運六氣。各有太
多。少。人之疾病。必隨氣而為盛衰。故治之。緩。岐伯
曰。氣有高低。病有遠近。證有中外。治有輕重。適其

至所為故也。歲有司天在泉則氣有高下。經有臟腑上下則病有遠近。在裏曰中。在表曰外。緩者治宜輕。急者治宜重也。適其至所為故也。

言必及於病至之。所而不可遇。亦不可不及也。

大要曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也。

君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。約大要大王

病之謂君。君當倍用。佐君之謂臣。比君當減。奇者陽數。即古所謂單也。偶者陰數。即古所謂複方也。故君一臣二，其數二。君二臣三，其數五。皆奇之制也。故君二臣四，其數六。君二臣六，其數八。皆偶之制也。

制也。奇方屬陰而重。故曰：近者奇之，遠者偶之。汗者

輕偶方屬陽而重。故曰：近者奇之，遠者偶之。汗者

不以偶下者，不以奇。近者為上，為陽，故用奇方。用

故用偶方。用其重而急也。汗者不能降下也。陰沉不能達表也。下者不以奇。陽升不能降下也。按本節

成方切用

總義

三

特舉奇偶陰陽以分汗下之機。則氣味之陰陽又豈後於奇偶哉。故下文復言之。此其微意。正不止於品數之奇偶。而實以發明方制之義爾。舊本云。汗者不以奇。偶而下者不以偶。而王太僕註云。表汗藥不以偶方。泄下藥不以奇制。是註與本文相反矣。然王註得理。而本文似誤。今改從之。奇音箕。補上治上。制以緩。補下治下。制以急。急則氣味厚。緩則氣味薄。適其至所。此之謂也。緩。補上治上。制以者。須氣味之厚。欲緩者。須氣味之薄。若制緩方而氣味原則峻而去速。用急方而氣味薄。則柔而不前。唯緩急厚薄得其宜。則適其病至之所。而治得矣。其要病所遠而中道氣味之者。食而過之。無越其制度也。言病所有深遠。而藥必由於胃。設用之無則藥未及病。而氣味在中道而止矣。故

當以食爲助。而使無遠勿達。是過之也。如飲酒
暖粥。以助藥力。之類。由此類推。則服食之疾徐根
梢之升降。以及湯膏丸散。各有所宜。故云無越其
制度也。王冰曰。病在腎而心氣不足。服藥宜
急過之。不以冰日。氣味如病。在腎而心氣復益。衰矣。餘
上。下。遠。近。則。同。完。素。曰。聖。人。治。上。不。犯。下。治。下。不
犯。上。治。中。則。上。下。俱。無。犯。故。曰。連。裏。用。黃。芩。以。治。中。
熱。好。古。曰。治。上。必。妨。下。治。下。必。妨。上。心。服。乾。薑。以。治。中。
肺。必。妨。脾。用。菰。蓉。以。治。腎。必。妨。心。服。乾。薑。以。治。中。
必。借。上。服。附。子。以。補。火。必。潤。水。心。按。服。藥。節。度。古
今。相。傳。有。食。前。食。後。之。分。然。總。宜。食。遠。腹。空。然。後
服。之。食。後。斷。不。可。服。蓋。飲。食。皆。受。納。於。胃。胃。氣。散
精。於。脾。脾。復。傳。精。於。肺。肺。主。治。節。然。後。分。布。臟。腑。
是。胃。乃。人。身。分。金。之。爐。也。未。有。藥。不。入。胃。而。能。即
至。於。六。經。者。況。肺。爲。華。蓋。竅。皆。下。向。以。受。飲。食。之
薰。蒸。藥。入。於。胃。亦。必。游。溢。精。氣。以。上。蒸。於。肺。未。聞
心。藥。飲。至。心。間。而。始。入。心。肺。藥。飲。至。肺。間。而。始。入
肺。也。若。上。膈。之。藥。食。後。服。之。胃。氣。先。爲。別。食。所。填

塞必待前食化完方能及後藥是欲速而反緩矣
且經脉在肉理之中藥之糟粕如何得到其所到
者不過氣味爾若云上隔之藥須令在上下隔之
藥須令在下則治頭之藥必須在頭治足之藥必
須在足乎此理之顯明易是故平氣之道近而奇
見者也不可不正其誤
偶制小其服也遠而奇偶制大其服也大則數少
小則數多多則九之少則二之平氣之道平其不
為近在下為遠遠者近者各有陰陽表裏之分故
遠方近方亦各有奇偶相兼之法如方奇而分兩
偶方偶而分兩奇皆互用之妙也故近而奇偶制
小其服小則數多而盡於九蓋數多則分兩輕分
兩輕則性力薄而僅及近處也遠而奇偶制大其
服大則數少而止於二蓋少則分兩重分兩重則
性力專而直達深遠也是皆奇偶兼用之法若病
近而大其制則藥勝於病是謂誅伐無過病遠而

小其制則藥不及病亦猶馬牛不相及爾上文
云近者奇之遠者偶之言法之常也此云近而奇
偶遠而奇偶言用之變也知奇之不去則偶之是
變知常則其應用不窮矣
謂重方偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼
反從其病也此示人以圓融通變也如始也用奇
變而為偶奇偶迭用是曰重方即後世所謂複方
也若偶之而又不去則當求其微甚真候而反佐
以取之反佐者謂藥同於病而順其性也如以熱
治寒而寒拒熱則反佐以熱而入之又如寒藥熱
熱格寒則反佐以寒而入之皆反佐變通之
以行也○因勢利導則易為力爾○王太僕曰夫熱
妙用也○寒與熱達微小之熱為寒所折微小之
與寒背○寒與熱達微小之熱為寒所折微小之
為熱所消○甚大寒熱則必能與違性者爭雄能與
異氣者相格○聲不同不相應氣不同不相合如是

則且憚而不取攻之攻之則病氣與藥氣抗而
自為寒熱以開閉固守矣是以聖人反其佐同
其氣令聲氣應合復令寒熱參合使其始同終異
凌潤而敗堅剛強必折柔脆同消爾。完素曰流
變在乎病主病在乎方制方在乎人。方有七。大小
緩急奇偶複也。○大者制方奇偶之承氣湯。假如小
承氣湯。奇之大方也。所謂因其攻裏而用之也。桂枝麻
黃偶之小方也。葛根青龍偶之大方也。所謂因其
發表而用之也。故曰汗不奇。下不偶。所謂因其
發表而用之也。故曰汗不奇。下不偶。所謂因其
大方有二。有君一臣二佐九之大方。有病有兼證而
邪不一大不可有君一臣二佐九之大方。有病有兼證而
服之大方。肝腎及下部之病。道遠者有分兩。大而頓
以心肺為近。肝腎及下部之病。道遠者有分兩。大而頓
為遠。身裏為近。肝腎及下部之病。道遠者有分兩。大而頓
分也。身半以下其氣三。觀之。身半以上其氣三。分也。
小方。有一二。有君一臣二。有分兩。少而頓服之。邪氣專

心、肺、及、在、上、之、病、者、宜、之、徐、徐、細、呷、是、也、完、素、曰、
肝、腎、位、遠、取、其、性、急、下、走、也、心、肺、位、近、藥、味、少、則、
劑、而、數、少、取、其、性、急、下、走、也、心、肺、位、近、藥、味、少、則、
其、氣、急、下、走、也、心、肺、位、近、藥、味、少、則、
易、散、上、行、也、王、氏、所、謂、肺、服、上、必、小、劑、而、數、多、取、其、
服、三、腎、服、一、乃、五、臟、生、成、之、數、也、從、正、脾、服、五、肝、
五、有、甘、以、緩、之、之、五、臟、生、成、之、數、也、從、正、脾、服、五、肝、
膈、取、其、留、戀、也、有、丸、以、緩、之、之、五、臟、生、成、之、數、也、從、正、脾、服、五、肝、
遲、慢、也、有、品、件、衆、多、之、緩、方、藥、衆、則、通、相、拘、制、不、
得、各、勝、其、性、也、有、無、毒、治、病、之、緩、方、藥、衆、則、通、相、拘、制、不、
功、緩、也、有、氣、味、俱、薄、之、緩、方、氣、味、俱、薄、則、長、於、補、
上、治、上、比、至、其、下、藥、力、已、衰、矣、急、方、有、四、有、急、病、
急、攻、之、急、方、中、風、開、格、之、病、是、也、有、湯、散、蕩、滌、之、
急、方、下、咽、易、散、而、行、速、也、有、毒、藥、之、急、方、毒、性、能、
上、涌、下、泄、以、奪、病、勢、也、有、氣、味、俱、厚、之、急、方、氣、味、
俱、厚、則、直、趨、於、下、而、力、不、衰、也、奇、方、有、二、有、獨、用、
一、物、之、奇、方、病、在、上、而、近、者、宜、之、有、藥、合、陽、數、一、
三、五、七、九、之、奇、方、宜、下、不、宜、汗、偶、方、有、三、有、兩、味、

相配之偶。有古之方相合之偶。古謂之複。
十之偶。宜汗不宜下。王太僕言汗藥不以偶。則
氣不足。以桂枝下藥。反以五味。為奇。大承氣下藥。
仲景制方。桂枝汗藥。反以五味。為奇。大承氣下藥。
反以四味。為偶。豈臨事制宜。復有增損乎。好古曰。
奇之不去。復以偶。偶之不去。復以奇。故曰。複。複者。
重也。再也。所謂十補一泄。數泄一補也。又傷寒見
風脈。傷風見寒脈。為脈證不相應。宜以複方主之。
從正曰。複方。有三。有二。有三。方及數方。相合之複。
方如桂枝。複方。有越婢。一湯。及五積散。之屬。是也。又本
方之外。別加餘藥。如調胃承氣。加連翹。薄荷。黃芩。
梔子。為涼膈散。之屬。是也。王太僕以分兩均齊之。複方。如
胃風湯。各等分。是也。王太僕以分兩均齊之。複方。如
中有偶。又有複。豈非偶乃二。方相合。複乃數。方相
合之謂乎。完素曰。方有七。劑有十。方不七。不足
以盡方之變。劑不十。不足以盡劑之用。方不對證。
非方也。劑不獨疾。非劑也。此乃太古先師設繩墨。

而取曲直。叔世方士。乃出規矩以為方圓。夫物各有性。制而用之。變而通之。施於品劑。其功用豈有窮哉。○十劑大意散見於本草從新內。

素問至真要大論帝曰五味陰陽之用何如岐伯曰辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽六者或收或散或緩或急或燥或潤或溼或堅以所利而行之調其氣使其平也吐也泄瀉也滲泄利小便及通竅也辛甘酸苦鹹淡六者之性辛主散主潤甘主緩酸主收主急苦主燥主堅鹹主溼淡主滲泄藏氣法時論曰辛散酸收甘緩苦堅鹹主溼故五味之用升而輕者為陽降而重者為陰各因其利而行之則氣可調而平矣。○涌首湧如泉涌也溼軟同帝曰非調

成方切用

總義

七

氣而得者。治之奈何。有毒無毒。何先何後。願聞其

道。非調氣。謂病有不因於氣而得者也。王太僕

謂積聚癥瘕。瘕氣。瘕氣。結核癰瘤之類也。二者因

氣動而外有所成。謂癰腫瘡瘍。疥疥疽痔。掉癰浮

腫。目赤。癰疹。肘腫。痛痒之類也。三者不因氣動而

病生於內。謂留飲。癰食。饑飽勞損。宿食霍亂。悲恐

喜怒。想慕憂結之類也。四者不因氣動而病生於

外。謂瘴氣。賊魅。蟲蛇。蠱毒。蜚尸鬼擊。衝薄墜墮。風

寒暑淫所射。刺割捶仆之類也。凡此四類。有獨治

內而愈者。有兼治內而愈者。有獨治外而愈者。有

兼治外而愈者。有須齊毒而攻擊者。有須無毒而

調引者。其於或重或輕。或緩或急。或收或散。或潤

或燥。或更或堅。岐伯曰。有毒無毒。所治爲主。適大

用各有所宜也。小爲制也。言但能去疾就安。即爲良方。不論藥之

有毒無毒。一以所治之病爲主。方之大

小當因病之輕重而為之制也。帝曰：請言其制。岐伯曰：君一臣二

制之小也。君一臣三佐五，制之中也。君一臣三佐

九，制之大也。此言用方寒者熱之，熱者寒之。治寒以熱

治熱以寒此微者逆之，甚者從之。病之微者如陽

正治法也寒者真形易見，其病則微，故可逆之。逆即下文之正

治也病之甚者如熱極反寒，寒極反熱，假證難辨。

其病則甚，故當從之。從即下文之反治也。王太

僕曰：夫病之微小者，猶人火也。遇草而燔，得木而

燔，可以溼伏。可以水滅，故逆其性，氣以折之，攻之

病之大甚者，猶龍火也。得溼而焰，遇水而燔，不知其性，以水折之，適足以光焰詣天。物窮方止矣。議滅然逆之，謂以寒攻熱，以熱攻寒。從之，謂攻以寒熱，須從其性用，不必皆同。是以下文曰：逆者正治。

從者反治。從少從多。堅者削之。客者除之。勞者溫
觀其事也。此之謂乎。堅者削之。客者除之。勞者溫
之。結者散之。留者攻之。燥者濡之。急者緩之。散者
收之。損者益之。逸者行之。驚者平之。上之下之。摩
之。浴之。薄之。劫之。開之。發之。適事為故。溫之。溫養
奔逸潰亂也。行之。行其逆滯也。平之。安之也。上之。
吐之也。摩之。按摩之也。薄之。追其隱藏也。劫之。奪
其強盛也。適事為故。帝曰。何謂逆從。岐伯曰。逆者
正治。從者反治。從少從多。觀其事也。以寒治熱。以
病者。謂之正治。以寒治寒。以熱治熱。從其病者。謂
之反治。從少。謂一同而二異。從多。謂二同而一異。
必觀其事之輕重。而為之增損。然則宜於全反者。
首當盡同無疑矣。○按治有逆從者。以病有微甚。

病有微甚者。以證有真假也。寒熱有真假。虛實有真假。真者正治。知之無難。假者反治。乃爲難。兩如寒熱之真假者。真寒則脈沉而細。或弱而遲。爲厥逆。爲嘔吐。爲腹痛。爲殭泄下利。爲小便清頻。卽有發熱。必欲得衣。此浮熱在外。而沉寒在內也。真熱則脈數有力。滑大而實。爲煩躁喘滿。爲聲音壯厲。或大便秘結。或小水赤澀。或發熱掀衣。或脹疼熱渴。此皆真病。真寒者宜溫。其寒真熱者直解其熱。是當正治者也。至若假寒者。陽證似陰。火極似水也。外雖寒而內則熱。脈數而有力。或沉而鼓擊。或身寒惡衣。或便秘熱結。或煩渴引飲。或腸垢臭穢。此則惡寒非寒。明是熱證。所謂熱極反寒。寒化亦曰陽盛格陰也。假熱者陰證似陽。水極似火也。外雖熱而內則寒。脈微而弱。或數而虛。或浮大無根。或弦芤斷續。身雖熾熱而神則靜。語雖譫妄而聲則微。或虛狂起倒。而禁之卽止。或蚊迹假斑。而淺紅細碎。或喜冷水。而所用不多。或舌胎面赤。而衣被不撤。或小水利而大便不結。此則惡熱非熱。

明是寒證。所謂寒極反兼熱化。亦曰陰盛格陽也。此皆假病。假寒者清其內熱。內清則浮陰退舍矣。假熱者溫其真陽。中溫則虛火歸原矣。是當從治者也。又如虛實之治。實則瀉之。虛則補之。此不易之法也。然至虛有盛候。則有假實矣。大實有羸狀。則有假虛矣。總之虛者正氣虛也。為色慘形疲。為神衰氣怯。或自汗不收。或二便失禁。或夢遺精滑。或嘔吐隔塞。或病久攻多。或氣短似喘。或勞傷過度。或暴困失志。或外證雖實而脈弱無神者。皆虛證之當補也。實者邪氣實也。或外閉於經絡。或內結於臟腑。或氣壅而不行。或血留而凝滯。必脈病俱盛者。乃實證之當攻也。然而虛實之間。最多疑似。有不可不辨其真爾。如通評虛實論曰。邪氣盛則實。正氣奪則虛。此虛實之大法也。設有人焉。正已奪而邪方盛者。將顧其正而補之乎。抑先其邪而攻之乎。見有不到的。則死生係之。此其所以宜慎也。夫正者本也。邪者標也。若正氣既虛。則邪氣雖盛。亦不可攻。蓋恐邪未去而正已先脫。呼吸變生。

則措手無及。故治虛邪者。當先顧正氣。正氣存則不致於害。且補中自有攻意。蓋補陰卽所以攻熱。補陽卽所以攻寒。世未有正氣復而邪不退者。亦未有正氣竭而命不傾者。如必不得已。亦當酌量緩急。暫從權宜。從少從多。寓戰於守。斯可矣。此治虛之道也。若正氣無損者。邪氣雖微。自不宜補。蓋補之則正無與而邪反盛。適足以藉寇兵而資盜糧。故治實證者。當直去其邪。邪去則身安。但法貴精專。便臻速效。此治實之法也。要之能勝攻者。方是實證。實者可攻。何慮之有。不能勝攻者。便是虛證。氣去不返。可不寒心。此邪正之本末。有不可不知也。惟是假虛之證。不多見。而假實之證。最多也。假寒之證。不難治。而假熱之治。多誤也。然實者多熱。虛者多寒。如丹溪曰。氣有餘便是火。故實能受寒。而不知氣不足便是寒。故虛能受熱。醫有不知真假本末者。害無窮矣。帝曰。反治謂何。岐伯曰。熱因寒用。寒因熱用。塞因塞用。通因通

用必伏其所主而先其所因。其始則同。其終則異。

可使破積。可使潰堅。可使氣和。可使必已。

用者如寒

大寒內結。當治以熱。然寒甚。格熱。熱不得前。則以熱藥冷服。下。啗之後。冷體既消。熱性便發。情且不違。而致大益。此熱因寒用之法也。寒因熱用者。如大熱在中。以寒攻治。則不入。以熱攻治。則病增。乃以寒藥熱服。入腹之後。熱氣既消。寒性遂行。情且協和。而病以減。此寒因熱用之法也。如五常政大論云。治熱以寒。溫而行之。治寒以熱。涼而行之。亦寒因熱用。熱因寒用之義。塞因塞用者。如下氣虛乏。中焦氣壅。欲散滿。則更虛其下。欲補下。則滿甚。於中治。不知本。而先攻其滿。藥入。或減。藥過。依然氣必更虛。病必漸甚。乃不知少服。則資壅。多服。則宣通。峻補其下。以疎啓其中。則下虛自實。中滿自除。此塞因塞用之法也。如大熱內蓄。或大寒內凝。積聚留滯。瀉利不止。寒滯者。以熱下之。熱滯者。以

寒下之。此通因通用之法也。以上四治。必伏其所主者。制病之本也。先其所因者。求病之由也。既得其本。而以真治真。以假對假。其始也。治類似同。其終也。病變則異矣。是為反治之法。故可使破積漬堅。氣和而病必聲。帝曰。善。氣調而得者何如。岐伯曰。已也。○塞入聲。

逆之從之。逆而從之。從而逆之。疏氣令調。則其道

也。氣調而得者。言氣本調和而偶感於外也。岐伯

言其治法。亦無過逆之從之而已。其間有宜主

治逆而佐從之者。有宜主治從而佐之者。皆所以疏泄其邪氣。而令其調和。此治氣調而病於外

者。道也。

素問至真要大論。帝曰。方制君臣何謂也。岐伯曰。主病之謂君。佐君之謂臣。應臣之謂使。非上下三

品之謂也

主病者對證之要藥也。故謂之君。君者

者謂之臣。味數少而分兩重。賴之以爲主也。佐君

迫也。應臣者謂之使。數可出人而分兩更輕。所以

備通行向導之使也。此則君臣佐使之義。非上

下三品。如下文善惡殊貫之謂也。○使去聲。

帝

曰三品何謂岐伯曰所以明善惡之殊貫也

前言方制

言處方之制。故有君臣佐使。此言藥性善惡。故有

上中下之殊。神農云。上藥爲君。主養命以應天。中

藥爲臣。主養性以應人。下藥爲佐使。主治病以應

地。故在本草經有上中下三品之分。此所謂善惡

貫也。素問至真要大論帝曰病之中外何如岐伯曰從

內之外者調其內從外之內者治其外

從內之外者內爲本

從外之內者外為本。從內之外而盛於外者先調

其內而後治其外。從外之內而盛於內者先治其

外而後調其內。病雖盛於標。治必先其本。而後可

求其本。中外不相及。則治主病。病也。主病重病也。此

猶律家二罪俱發。科其重也。按此篇即三因之

義也。如金匱要略曰。千般病。難不越三條。一者經

絡受邪。入臟腑。為內所因也。二者四肢九竅。血脈

相傳。壅塞不通。為外皮膚所中也。三者房室金刃

蟲獸所傷也。故無擇著三因方曰。有內因。有外因。

有不內外因。蓋本於仲景之三條。而仲景之論實

本諸此爾。○疾。帝曰。善。病之中外何如。前問病之

昌震切。病也。帝曰。善。病之中外何如。前問病之

標本之義。故此復問。蓋岐伯曰。調氣之方。必別陰

欲明陰陽治法之詳也。岐伯曰。調氣之方。必別陰

陽定其中外。各守其鄉。內者內治。外者外治。微者調之。其次平之。盛者奪之。汗之下之。寒熱溫涼衰

之以屬。隨其攸利。

方法也。陰陽三陰三陽也。中外藏府經絡也。各守其鄉。各安於

其所也。微者調之。謂小寒之氣。和之以溫。小熱之氣。和之以涼也。其次平之。謂大寒之氣。平之以熱。大熱之氣。平之以寒也。盛者奪之。謂邪之甚者。當直攻而取之。如甚於外者。汗之。甚於內者。下之。凡宜寒宜熱宜溫宜涼。各求其同氣者。以衰去之。是謂隨其所利也。○別必列切。

素問五常政大論。帝曰。有毒無毒。服有約乎。

約。度也。禁

服篇曰。夫約方者。猶約囊也。囊滿而岐伯曰。病有弗約。則輸泄。方成弗約。則神與弗俱。

新久。方有大小。有毒無毒。固宜常制矣。

大。病重者宜。病輕者

宜小。無毒者宜多。有毒者宜少。皆常制之約也。大毒治病。十去其六。常毒

治病。十去其七。小毒治病。十去其八。無毒治病。十

去其九。藥性有大毒。常毒。小毒。無毒之分。去病有

法。藥不及病。則無濟於事。藥過於病。則反傷其正。而生他患矣。故當知約制而進止有度也。○王氏

曰。大毒之性烈。其為傷也多。小毒之性利。其為傷

也少。常毒之性烈。減大毒之性一等。加小毒之性一

等。所傷可知也。故至約必止之。以待來證。爾然無

毒之藥。性雖平和。久而多之。則氣有偏勝。必有偏

絕。久攻之。則臟氣偏弱。既弱且穀。肉果菜。食養盡

之。無使過之。傷其正也。餘未盡者。則當以穀肉果
菜食養以盡病邪。勿以毒藥盡病邪也。如藏氣法
時論曰。毒藥攻邪。五穀為養。五果為助。五畜為益
或片刀刊

五菜爲充者。是也。然毒藥雖有約制。而飲食不盡。亦貴得宜。不可使之太過。過則反傷其正也。

行復如法。法以此而猶有未盡。則再行。前必先歲氣。

無伐天和。五運有紀。六氣有序。四時有令。陰陽有節。皆歲氣也。人氣應之。以生長收藏。卽

天和也。設不知歲氣變遷而妄呼寒熱。則邪正盛衰無所辨。未免犯歲氣伐天和矣。天枉之由。此其

爲甚。無盛盛。無虛虛。而遺人天殃。邪氣實者復助之。甚。無盛盛。無虛虛。而遺人天殃。邪氣實者復助之。

者復攻之。虛其虛矣。不知虛實。妄施攻補。以致盛者愈盛。虛者愈虛。真氣日消。則病氣日甚。遺人天

殃。醫之無致邪。無失正。絕人長命。盛其盛。是致邪。咎也。無致邪。無失正。絕人長命。盛其盛。是致邪。

正也。重言之。所以深戒夫伐天和而絕人長命。以見歲氣不可不慎也。

厥陰風木司天。巳亥風淫所勝。平以辛涼。王註云。厥

盛熱故以佐以甘苦以甘緩之以酸瀉之風為木氣金能

勝之故平以辛涼過於辛恐反傷其氣故佐以苦

甘苦勝辛甘益氣也木性急故以甘緩之以酸瀉

之者木之正味○清反勝之治以酸溫佐以甘苦

其瀉以酸也○或氣有不及則金之清氣反能勝之故當治以酸

溫酸求木之同氣溫以制清也佐以甘苦甘以緩

肝之急苦以溫金也

少陰火君司天子午熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘

以酸收之熱為火氣水能勝之故平以鹹寒佐以

經而不去熱之實也熱盛於○寒反勝之治以甘溫

佐以苦酸辛故當治以甘溫甘能勝水溫能制寒

也。佐以苦酸辛。寒得苦而溫。得辛而散。且火為水勝。則心苦緩。故宜食酸以收之。

太陰土司天丑未溼溼所勝平以苦熱佐以酸辛。

以苦燥之以淡泄之。溼為土氣。燥能除之。故平以苦熱。酸從木化。制土者也。而

辛勝酸。所以防酸之過也。故佐以酸辛。以苦燥之者。苦從火化也。以淡泄之者。淡能利竅也。藏氣法時論曰。脾苦溼。急食苦以燥之。是也。溼上甚而熱治以苦溫佐以甘

辛以汗為故而止。溼鬱於上而成熱者。治以苦溫。苦以泄熱。溫以行溼也。佐以甘

辛。甘以和中。辛以散鬱也。則溼熱之在上。以微汗如故而止矣。○熱反勝之治以

苦寒佐以苦酸。苦寒所以祛熱。熱勝則亡陰液。故佐以苦酸。

少陽火相司天寅申火溼所勝平以鹹冷佐以苦甘

以酸收之。以苦發之。以酸復之。熱淫同。水能勝火。故平以鹹。

冷。苦能瀉火之實。甘能緩火之急。故佐以苦甘。火盛而散越者。以酸收之。火鬱而留伏者。以苦發之。然以發去火。未免傷氣。故又當以酸復之。而火熱二氣同治也。○寒反勝之。治以

甘熱。佐以苦辛。或氣有不及。與上文寒勝熱淫大同。

陽明燥司天。卯酉燥淫所勝。平以苦溫。佐以酸辛。

以苦下之。燥為金氣。火能勝之。平以苦溫。苦從火化也。佐以酸辛。酸能生津。辛能潤燥也。

燥結不通。則邪實於內。故以苦下之。○熱反勝之。治以辛寒。佐以苦

甘。辛寒所以潤燥散熱。苦甘所以瀉火生金。

太陽寒司天。辰戌寒淫所勝。平以辛熱。佐以甘苦。

以鹹瀉之

辛熱足以散寒。苦甘可以勝水。以鹹瀉之。水之正味。其瀉以鹹也。

○熱

反勝之治

以鹹冷佐以苦辛

或氣有不及則熱反勝之。故治以鹹冷抑

火邪也。佐以苦辛。苦能泄熱。辛能散熱也。

厥陰

風木

在泉

寅申

風淫於內

治以辛涼

佐以甘苦

以甘緩之

以甘緩之

以辛散之

治以辛涼。佐以甘苦。以甘緩之。俱與上文司天治同。以辛

散之者。所謂肝欲散。急食辛以散之也。

○清反勝之治

以酸溫

佐以

甘苦以辛平之

治以酸溫。佐以苦甘。俱與司天反勝治同。以辛平之者。木之正味。其

補以辛。金之正味。其瀉以辛也。

少陰

火君

在泉

卯酉

熱淫於內

治以鹹寒

佐以甘苦

以甘苦

以酸收之以苦發之

治以鹹寒佐以甘苦以酸收之俱與上文司天治同以苦

發之者熱鬱於內而

○寒反勝之治以甘熱佐以

苦辛以鹹平之

此與上文司天反勝大同以鹹平之者火之正味其補以鹹水之正

味其瀉以鹹也

太陰在泉

辰戌

溼淫於內治以苦熱佐以酸淡

以苦燥之以淡泄之

此與司天

○熱反勝之治以

苦冷佐以鹹甘以苦平之

或氣有不及則火之熱氣反能勝之故當治以

苦冷抑火邪也佐以鹹甘鹹寒制熱甘溫補土也以苦平之即苦冷之義

少陽在泉

巳亥

火淫於內治以鹹冷佐以苦辛

以苦發之

相火畏火也。故宜治以鹹冷。苦能泄火。辛能散火。故用以為佐。以酸收之。以苦

發之。義與上。文熱淫治同。

○寒反勝之。治以甘熱。佐以辛苦。以

鹹平之

或氣有不及。與上文熱司於地者同其治。

陽明

金燥

在泉

年子午

燥淫於內。治以苦溫。佐以甘辛。

以苦下之

燥為金氣。火能勝之。治以苦溫。苦從火化也。佐以甘辛。木受金傷。以甘緩之。金

之正味。以辛瀉之也。燥結不通。則邪實於內。故當以苦下之。按上文燥淫所勝。佐以酸辛。與此甘辛

稍異。又如六元正紀大論。子午年陽明在泉。亦云下酸溫。皆與此不同。考之藏氣法時論曰。肺苦氣

上逆。急食苦以泄之。用酸補之。辛瀉之。正此之辨。

○熱反勝之。治以平寒

佐以苦甘。

以酸平之。

以和為利。

或氣有不及。則熱反勝之。治以平寒。

反勝之。治以平寒。

以金司於地。氣本肅殺。若用大寒。必助其慘。故但宜平寒。抑其熱。爾佐以苦甘。所以瀉火也。以酸平

之。金之正味。其補以酸也。以和為利。戒過用也。即平寒之意。

太陽寒水在泉。年丑未。寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。

以鹹瀉之。以辛潤之。以苦堅之。寒為水氣。土能勝水。熱能勝寒。故治

以甘熱。甘從土化。熱從火化也。佐以苦辛等義。如藏氣法時論曰。腎苦燥。急食辛以潤之。腎欲堅。急

食苦以堅之。用苦。○熱反勝之。治以鹹冷。佐以甘補之。鹹瀉之也。

辛以苦平之。或氣有不及。則熱反勝之。故治以鹹能散也。以苦平之者。水之正味。其補以苦也。○王

氏曰。此六氣方治。與前淫勝法殊貫。其云治者。瀉客邪之勝氣也。云佐者。皆所利所宜也。云平者。補

已弱之正氣也。○時珍曰。司天主上半年。天氣司

地主下半年。地氣司

之故六淫謂之所勝上淫於下也故曰平之在泉
主下半年地氣司之故六淫謂之於內外淫於內
也故曰治之當其時而反得勝已之氣謂之反勝
○按六氣盛衰不常有所勝則有所復王氏亦曰
凡先有勝後必復詳見至真大要論欲深造者當
究心焉○按以上所言乃五運六淫客氣隨每歲
年辰而變遷者也又凡一歲之主氣始於大寒日
交厥陰風木之初氣次至春分日交少陰君火之
二氣次至小滿日交少陽相火之三氣次至大暑
日交太陰溼土之四氣次至秋分日交陽明燥金
之五氣次至小雪日交太陽寒水之終氣每氣各
主六十日六氣分主四時歲歲如常故曰主氣客
氣布行天合以加臨於主氣之上斯上下相召而
病變生矣○時珍曰經云必先歲氣毋伐天和又
曰升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之故春月宜
加辛溫之藥以順春升之氣夏月宜加辛熱之藥
以順夏浮之氣秋月宜加酸溫之藥以順秋降之氣
冬月

宜加苦寒之藥以順冬沉之氣所謂順時氣而養
天和也經又云春省酸增甘以養脾氣夏省甘增
辛以養肺氣長夏省甘增鹹以養腎氣秋省辛增
酸以養肝氣冬省鹹增苦以養心氣此則不伐天
和而又防其太過所以體天地之大德也味者捨
本從標春用辛涼以伐木夏用鹹寒以抑火秋用
苦溫以泄金冬用辛熱以潤水謂之時藥殊背素
問逆順之理以夏月伏陰冬月伏陽推之可知矣
雖然月有四時日有四時或春得秋病夏得冬病
神而明之機而行之變通權宜又不可執一也

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷首

內經方

靈樞方五素問方七

附方六附方五

寒痺方

季春痺方

目不瞋方

猛疽方

萬氏方

肘後方

千金二方

陳文中方

敗疵方

鼓脹方

范汪方普濟方

何大英方

正

傳方

醫鑑方

脾癰方

血枯方

陽厥方

酒

風方

尸厥方

五疫方

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人

周蘭九生庭
殷豫龍浩如
同較

成方切用

內經方

內者性命之道。經者載道之書。其書乃黃帝與岐伯鬼臾區伯高少師少俞雷公六臣講求而成。其方高簡奧絕不易測識。今人罕能用之者。然既為古聖之神方。自不得不錄之。以冠於卷首。

用醇酒二十觔。蜀椒一升。乾薑一觔。桂心一觔。漬酒中。浸以綿絮布巾。用生桑炭炙巾。以熨寒痺所

刺之處

靈樞壽夭剛柔篇

神靈之樞要。是謂靈樞。按漢藝文志曰黃

帝內經十八卷。蓋靈樞九卷。素問九卷。即內經也。二經各載八十一篇。皆合黃鍾九九之數。而天人

之道盡乎是矣。黃帝曰。余聞刺有三變。何謂三變。按史記

公孫名軒轅。有熊國君少典之子。繼神農而伯高。有天下。都軒轅之邱。以土德王。故號黃帝。

答曰。有刺營者。有刺衛者。有刺寒痺之留經者。

刺營

者。刺其陰。刺衛者。刺其陽。刺寒痺。黃帝曰。刺三變

者。溫其經。三刺不同。故曰三變。者。奈何。伯高答曰。刺營者。出血。刺衛者。出氣。刺寒

痺者。內熱。調經論亦曰。取血於營。取氣於衛。內熱義如下文。黃帝曰。營衛

寒痺之為病。奈何。伯高答曰。營之生病也。寒熱少

氣血上下行故為寒熱往來陰病則陰虛陰虛則

無氣故為少氣邪在血故為上下衛之生病也氣

妄行所以刺營者當刺其血分

痛時來時去怫怫音憤戲貴響風寒客於腸胃之中

衛屬陽為水穀之悍氣病在陽分故為氣痛氣無

定形故時來時去怫怫鬱怒也憤太息也貴響腹鳴

如奔也言氣分之病風寒外襲而客於腸胃之寒

間以六腑屬表而陽邪歸之故病亦生於衛氣寒

痺之為病也留而不去時痛而痺不仁寒痺久留

脈不行或凝滯而為痛或黃帝曰刺寒痺內熱奈

皮膚不知痛痒而為不仁

何伯高答曰刺布衣者以火焮之刺大人者以藥

熨之內熱謂溫其經也布衣血氣瀟灑故當以火
焮之焮之即近世所用雷火鍼及艾蒜灸之類
成方切用

○燂音灼也

黃帝曰藥熨奈何伯高答曰用淳酒二十

觔蜀椒一升乾薑一觔桂心一觔凡四種皆咬咀

漬酒中用綿絮一觔細白布四丈并納酒中置酒

馬矢燂

音燂

中蓋封塗勿使泄五日五夜出布綿絮

曝乾之乾復漬以盡其汁每漬必晬

音晬

其日乃出

乾乾并用滓

音滓

與綿絮複

音福

布爲複巾長六七尺

爲六七巾則用之生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之

處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十遍而

止汗出以巾拭身亦三十遍而止

咬咀者謂碎之如大豆其粒類

可以咀嚼之。又吹去細末。然後煎之。取其清汁也。
漬浸也。馬矢中者。然乾馬屎而煨之也。此西北
方所常用者。塗鹽泥封固也。辟周口也。複布為襪
巾者。重布為巾。如今之夾袋。所以盛貯綿絮藥滓
也。淫机也。炙布以生桑炭者。桑能利關節。除風寒
溼痺諸痛也。大人血氣清滑。故當於未刺之先。及
既刺之後。但以藥熨。則經
通汗出。而寒痺可除矣。
起步內中。無見風。每刺
必熨。如此病已矣。此所謂內熱也。
刺後起步於密
室內。欲其氣

血行。而慎避風寒也。凡
此者。皆所謂內熱之法。

治之以馬膏。膏其急者。以白酒和桂。以塗其緩者。
以桑鉤鉤之。治季春痺。靈樞經筋篇曰。足陽明
之筋病。足中指支脛轉筋。腳跳堅。
本經之筋起於
中指。結於跗上。

邪外上行。加於輔骨。上結於膝外廉。其直者。伏兔

上循脛。結於膝也。跳者。跳動。堅者。堅強也。轉筋。脾前腫瘡。同疝。腹筋急。其直者。上循伏兔。結

而布也。引缺盆及頰。卒口僻。急者。目不合。熱則筋縱

目不開。頰筋有寒。則急。引之。移口。有熱。則筋弛。縱

緩。不勝收。故僻。口上合於太陽。太陽為目上綱。陽

明為目下綱。故凡目之不合。不開。口之急。縱歪。治

僻者。皆足陽明之筋病。寒則急。而熱則緩也。治

之以馬膏。膏其急者。以白酒和桂。以塗其緩者。以

桑鉤鉤之。卽以生桑炭置之坎中。高下以坐等。以

膏熨急頰。且飲美酒。噉

音淡

美炙肉。不飲酒者。自強

也爲之三拊而已

馬膏馬脂也口頰髑髀乃風中血脈也手足陽明之筋絡

於日會太陽之筋絡於日寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺營衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脈用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其營衛以通其經絡桑能治風痺通節竅以桑鉤鉤之者鉤正其口也復以生桑火煖置之坎之中高下以坐等者欲其深淺適中便於坐而得其煖也然後以前膏熨其急頰且飲之美酒噉之美味皆助血舒筋之法病在上者酒以行之甘以助之也雖不善飲亦自強之

在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰季春痺也

足陽明正盛之經應三月之氣也

成方切用

內經卷首

以千里水煮秣米半夏湯治目不瞑靈樞邪客

篇黃帝問於伯高曰夫邪氣之客人也或令人目

不瞑不臥出者何氣使然邪氣感人也。令人寐無伯

高曰五穀入於胃也其糟粕音朴津液宗氣分爲三

隧音遂故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心脈而行

呼吸焉隧道也。糟粕之道出於下焦。津液之道出

喉嚨爲肺之系而下貫於營氣者泌其津液注之

於脈化以爲血以榮四末內注五臟六腑以應刻

數焉營氣出於中焦。中焦受水穀之氣泌其津液

變化以爲血脈外而四肢內而臟腑無所不

至。故其運行之數與刻數皆相應焉。泌音祕泉水貌

衛氣者出其悍氣之

慄疾而先行於四末分肉皮膚之間而不休者也

晝行於陽夜行於陰常從足少陰之分間行於五

臟六腑

衛氣慄疾滑利不能入於脈中故先行於四末分肉皮膚之間而不休者也晝行於

陽常從足太陽始夜行於陰常從足少陰始

今厥氣客於五臟六腑則

衛氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽則陽

氣盛陽氣盛則陽蹻陷不得入於陰陰虛故目不

瞑

邪氣逆於臟腑則衛氣不得入於陰分故偏盛於陽陽偏盛則陽蹻陷陷者受傷之謂陽盛陰

虛故目不瞑。蹻有五音蹻皎喬脚又極虐切

黃帝曰善治之奈何伯高

曰補其不足寫其有餘

此刺治之補寫也。補其不足。即陰蹻所出。是少陰之

照海也。寫其有餘。即陽蹻所出。是太陽之申脈也。若陰盛陽虛而多臥者。自當補陽寫陰矣。調

其虛實以通其道而去其邪。飲以半夏湯一劑。陰

陽已通。其臥立至。

謂既刺之後。仍當用藥以治之。凡不臥之證。有邪實者。多屬外

因。有營虛者。多屬內因。此半夏湯一法。蓋專為邪實者設爾。

黃帝曰。善此所謂

決瀆壅塞。經絡大通。陰陽和得者也。願聞其方。伯

高曰。其湯方以流水千里以外者。八升。揚之萬遍。

取其清五升。煮之炊以葦薪。

古今量數不同。大約古之黍量一斗。合今

之鐵斛數三升二合。然則云八升者。即今之二升五合六勺云。五升者。即今之一升六合許爾。火

沸置秫米一升治半夏五合徐炊令竭爲一升

半火沸者先以火沸其水而後置藥於中也秫卽黃米乃梁米粟米也味甘微寒能利大

腸治陽盛陰虛夜不安故並用之秫米一升約今

散引除腹脹之三合二勺半夏五合約今之一合六勺炊至一升半約今之四合八勺也去其滓飲

汁一小杯日三稍益以知爲度故其病新發者覆

杯則臥汗出則已矣久者三飲而已也

合豕膏冷食治猛疽靈樞癰疽篇黃帝曰願盡

聞癰疽之形與忌曰名岐伯曰癰發於嗑中名曰

猛疽猛疽不治化爲膿膿不寫塞咽半日死其化

戊子四月內經卷之六猛疽方六

爲膿者寫則合豕膏冷食三日已

猛疽言爲害之急也若膿已寫

當服豕膏可以愈之卽豬脂之煉淨者也觀萬氏方治肺熱暴瘡用豬脂一觔煉過入白蜜一觔再煉少頃濾淨冷定不時挑服一匙卽愈又肘後方治五種疸疾用豬脂一觔溫熱服日三當利乃愈千金方治小便不通豬脂一觔水二升煎三沸飲之立通治關格閉塞豬脂薑汁各二升微火煎至二升下酒五合和煎分服陳文中方治痘瘡便閉用肥豬臙一塊水煮熟切如豆大與食自然臙臙滋潤痂疔易落無損於兒心鏡方治上氣欬嗽豬肪四兩煮百沸切和醋醬食之若無疾服此最能潤肺潤腸卽是豕膏之屬老人痰嗽不利及大腸祕結者尤宜用之

劉蒨草根各一升煮飲治敗疵

靈樞癰疽篇

岐伯曰癰發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也

灸之其病大癰膿治之其中乃有生肉大如赤小

豆劉蔞

蔞音蔞同

草根各一升以水一斗六升煮之

竭爲取三升

則強飲厚衣坐於釜上令汗出至足

已

蔞芰也蔞連翹也二草之根俱能解毒故各用一升大約古之一升得今之三合有零以水一

斗六升煮取三升其折數類此馬玄臺曰蔞蔞即今之連翹也以連翹及草根煮汁以強飲之

雞矢醴治鼓脹

素問腹中論

平素所講問黃帝是謂素問

問曰有病心腹滿旦食不能暮食此爲何病岐伯

對曰名爲鼓脹

心腹留滯脹滿不能再食其脹如鼓故名鼓脹

帝曰治之

奈何岐伯曰治之以雞矢醴一劑知二劑已一劑知

成方切用

內經

卷首

敗鼓方

鼓脹方

七

其效。二劑可已其病。王冰云。本草雞尿利小便。並
不治。蠱脹。今方法當用湯漬服之。爾李時珍曰。鼓
脹生於溼熱。亦有積滯成者。雞尿能下氣消積。通
利大小便。故治鼓脹有殊功。此岐伯神方也。醴者
一宿初來之酒醴也。又按范汪方云。宋青龍中司
徒吏顏奮女苦風疾。一髀偏痛。一人令穿地作坑。
取雞屎。荆葉然之。安脛入坑中。熏之。有長蟲出。遂
愈也。普濟方云。治鼓脹。旦食不能暮食。由脾虛不
能制水。水反勝土。水穀不運。氣不宣流。故令中滿。
其脈沉實而滑。宜雞矢醴主之。何大英云。諸腹脹
大。皆屬於熱。精氣不得滲入膀胱。別走於臍。溢於
皮裏膜外。故成脹滿。小便短澀。雞矢性寒利。小便
誠萬全。不傳之寶也。用臘月乾雞矢。白牛舐袋盛。
以酒醴一斗。漬七日。溫服三盃。日三。或為末服。二
錢亦可。正傳云。用羯雞矢一升。研細炒焦。色地上
出火毒。以百沸湯淋汁。每服一大盞。調木香。檳榔
末各一錢。日三服。以平為度。又按醫鑑等書云。用
乾羯雞矢八合。炒微焦。入無灰好酒三碗。其煎乾

至一半許用布濾取汁五更熱飲則腹鳴辰巳時
行二三次皆黑水也次日覺足面漸有縐紋又飲
一次則漸縐至膝上而病愈矣○凡鼓脹山於停
積及溼熱有餘者宜用之○扶虛者禁之○吳鶴皋
曰朝寬暮急病在營血○帝曰其時有復發者何
也穢物從陰化可入營血也○岐伯曰此飲食不節故時有病也
鼓脹之病
也反復也
本因停滯故不雖然其病且已時故當病氣聚於
可復縱飲食也
腹也言雖是飲食不節時有病者又有病且已之
後其根未盡拔除病氣重繫於腹亦復發焉
治之以蘭除陳氣也治脾痺素問奇病論帝曰
有病口甘者病名謂何何以得之岐伯曰此五氣
之溢也名曰脾痺五氣五味之所化也脾熱病也夫五味入口藏

於胃脾爲之行其精氣津液在脾故令人口甘也

脾主爲胃行其津液者也故五味入胃則此肥美

之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人

內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉爲消渴肥者

助陽故能生熱甘者性緩不散故能留中熱留

不去久必傷陰其氣上溢故轉爲消渴之病治

之以蘭除陳氣也蘭草性味甘寒能利水道辟不

津止渴潤肌膚故可除陳積畜熱之氣按蘭草

俗名省頭草即澤蘭之一類二種有以爲即山蘭
以四烏鯁骨一薏茹二物合併丸以雀卵飲以鮑

魚汁治血枯。素問腹中論帝曰有病胸脇支滿

者妨於食病至則先聞腥臊音騷臭出清液先唾血

四支清目眩時時前後血病名謂何何以得之支

者滿如支膈也肺主氣其臭腥肝主血其臭臊肺

氣不能平肝則肝肺俱逆於上濁氣不降清氣不

升故聞腥臊而吐清液也口中唾血血不歸經也

四支清冷氣不能周也頭目眩運失血多而氣隨

血去也血氣既亂故於前陰後岐伯曰病名血枯

陰血不時見而月信反無期矣

此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝

傷故月事衰少不來也

血枯者月水斷絕也致此

時有所大脫血如胎產既多及崩淋吐衄之類

則以醉後行房血盛而熱因而縱肆則陰精盡泄

戊子

月內

血枯方

七

精去則氣去。故中氣竭也。夫腎主閉藏。肝主疏泄。不惟傷腎。而且傷肝。及至其久。則三陰俱虧。所以有先見諸證。如上文所云。而終必至於血枯。則月事衰少不來也。此雖以女子爲言。若丈夫有犯前證。亦不免爲精枯之病。帝曰。治之奈何。復以何術。則勞損之屬皆是也。岐伯曰。以四烏鰂骨。一蘆茹。二物并復者。復其血。氣之原也。合之丸。以雀卵大如豆。以五丸爲後飯。飲以鮑魚汁。利腸中。及傷肝也。烏鰂。卽烏賊也。骨名。海鰔蛸。氣味鹹溫。而瀉主。女子赤白漏下。及血閉血枯。亦能令人有子。蘆茹。卽藺茹。王冰言。取其能散惡血。以通經脈。雀。卽麻雀也。雀卵氣味甘溫。能補益精血。主男子陰痿不起。故可使多精有子。及女子帶下。便溺不利。後飯者。先藥後飯也。鮑魚。卽今之淡乾魚也。諸魚皆可爲之。惟石首鮑魚者。爲勝其氣味辛溫。無毒。魚本水中之物。

故其性能入水臟通血脈益陰氣煮汁服之能同
諸藥通女子血閉也。以上四藥皆通血脈血主於
肝故凡病傷肝者亦皆可用之。蘇頌曰本草諸藥
竝不治血枯而經法用之是攻其所生所起爾時
珍曰今人知雀卵能益男子陽虛不知能治女子
血枯蓋雀卵益精血爾。按薏苡甲乙經及太素
新校正李氏綱目俱作薏苡獨張景岳以爲即薏
草也以薏草一名茹薏能止血治崩又能活血通
經脈也存之以備參考。

以生鐵洛爲飲治陽厥 素問病能論帝曰有病

怒狂者此病安生怒狂者多怒而狂也即岐伯曰

生於陽也生於陽氣之逆也帝曰陽何以使人狂岐伯曰

陽氣者暴折而難決故善怒也病名曰陽厥陽氣宜於

成方切用內經卷首陽厥方十

暢達若暴有折挫不得剖決故令善怒帝曰何以

而知之岐伯曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而

動大疾此其候也陽明常動者謂如下關地倉大

常動者也巨陽少陽不動者謂巨陽惟委中崑崙

少陽惟聽會懸鐘其脈雖微動而動不甚也於其

不甚動者而動且大疾則其常動帝曰治之奈何

者更甚矣此即陽厥怒狂之候岐伯曰奪其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪

其食即已五味入口而化於脾食入於陰也藏於

胃以養五臟氣長氣於陽也食少則氣衰故節奪其食不使胃火復助陽邪則陽厥怒狂者可已使之服以生鐵洛為

飲夫生鐵洛者下氣疾也

生鐵洛者即爐冶間錐落之鐵屑用水研浸可

以爲飲其屬金其氣寒而重最能墜熱開結平木火之邪故可以下氣疾除怒狂也凡藥中用鐵精鐵華粉銀砂鐵緒水之類皆同此意

以澤瀉朮各十分麋銜五分合以三指撮爲後飯

治酒風 素問病能論帝曰有病身熱解慳汗出

如浴惡風少氣此爲何病岐伯曰病名曰酒風此

風論中所謂漏風也酒乃麴藥熱藥所成故令身熱溼熱傷筋縱而不收持故懈惰溼得熱而蒸故多汗多汗則氣屢泄而衛虛故惡風帝曰治之奈

而少氣因酒得風而病故曰酒風 帝曰治之奈

何岐伯曰以澤瀉朮各十分麋銜五分合以三指

撮爲後飯

澤瀉味甘鹹性微寒能滲利溼熱朮甘苦氣溫能補中燥溼止汗麋銜卽薇銜

戎方切用

卷首

酒風方

酒風方

七

一名無心草。南人呼為吳風草。即鹿銜草。蓋麋鹿一類也。味苦微寒。主治風溼。十分者倍之也。五分者減半也。合以三指。用三指撮。合以約其數。而為煎劑也。飯後藥先。故曰後飯。

鬻其左角之髮方一寸。燔治。飲以美酒。治尸厥。

素問繆刺論曰。邪客於手足少陰太陰足陽明之

絡。此五絡皆會於耳中。上絡左角。邪客於手少陰

經手太陰肺經足太陰脾經足陽明胃經五絡俱

竭。令人身脈皆動而形無知也。其狀若尸。故曰尸

厥。五絡俱竭。陰陽離散也。身脈皆動。筋惕肉瞤。刺

其足大指內側爪甲上去端如韭葉隱白穴也。

後刺足心。足少陰之井。湧泉穴也。後刺足中指爪甲上各一

痛。足陽明之井。厲兌穴也。後刺手大指內側去端

如韭葉。手太陰之井。少商穴也。後刺手心主衝穴也。上文五

絡未及手心中也。此刺之。少陰銳骨之端各一痛立已。神

門穴。手少陰也。不已以竹管吹其兩耳。以小竹管納對

陰之腋也。勿令氣泄。所以溫助五絡氣可復通也。新校正

云按陶隱居謂吹其左耳極三度復吹其右耳三

度也。鬻其左角之髮方一寸燔治。飲以美酒一杯不

能飲者灌之立已。也鬻刺同左角之髮五絡之血餘

助藥力行血氣也補以
其類故可使尸厥立已。
戊方切月臨
卷中教
生

小金丹治五疫 素問遺篇刺法論黃帝曰余聞

五疫之至皆相傳易無問大小病狀相似不施救

療如何可得不相移易者五疫即五運疫癘之氣如何可得不相移易者

謂欲禁止其傳染也岐伯曰不相染者正氣内存邪不可干

避其毒氣天牝從來復得其往氣出於腦即不邪

干疫癘乃天之邪氣若吾身正氣內固則邪不可干故不相染也天牝鼻也鼻受天之氣故曰天

牝老子謂之玄牝是亦此義氣自空虛而來亦欲其自空虛而去故曰避其毒氣天牝從來復得其

往也蓋以氣通於鼻鼻連於腦中流布諸經令人相染矣氣出於腦為嚏或張鼻泄之則邪從鼻出

毒氣可散也氣出於腦即先想心如日應人之心想心

如口。即所以存吾之氣。壯。欲將入於疫室。先想青

氣自肝而出。左行於東。化作林木。心之所至。氣必至焉。故存想之。

則神有所注。而氣可王矣。左行於東。化作林木之狀。所以壯肝氣也。次想白氣自肺

而出。右行於西。化作戈甲。肺氣也。壯肺氣也。次想赤氣自心

而出。南行於上。化作焰明。心氣也。壯心氣也。次想黑氣自腎

而出。北行於下。化作水。腎氣也。壯腎氣也。次想黃氣自脾而

出。存於中央。化作土。脾氣也。壯脾氣也。五氣護身之畢。以想

頭上如北斗之煌煌。然後可入於疫室。煌煌。輝耀貌。天行疫

癘。傳染最速。故當謹避之。如此。又一法於立春之日。日未出而吐

當謹避之。如此。又一法於立春之日。日未出而吐

之

舊註日用遠志去心以水煎之飲二盞吐之不疫

又一法於雨水日後

三浴以藥泄汗

謂以祿邪散毒之藥煎湯三浴以泄其汗也

又一法小

金丹方辰砂二兩水磨雄黃一兩葉子雌黃一兩

紫金半兩

以金箔同研之可爲細末

同入合中外固了地一尺

築地實不用爐不須藥制用火二十觔煨之也七

日終

常令火不斷

候冷七日取次日出合子埋藥地中

七日取出順日研之三日煉白沙蜜爲丸如梧桐

子大每日望東吸日華氣一口冰水下一丸和氣

嚥之服十粒無疫干也

合子卽磁礮之屬順日研之謂左旋也。按此遺篇

之言乃出後人增附法非由古未足深信。避疫之法必節慾節勞仍勿忍饑以近其氣自可無慮。

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷一上

治氣門

正方一十三
附方二十七

桔萎薤白白酒湯

枳實薤白桂枝湯

四君子湯

異功

散六君子湯

香砂六君子湯

四獸飲

三白

味人參散

又六君子湯

七味白朮散

三白

湯六神散

八珍湯

十全大補

中益氣湯

補湯大防風湯

溫經益元散

補中益氣湯

升陽湯

升陽順氣湯

參朮益胃湯

調中益氣

氣湯調營養衛湯

順氣和中湯

補中益氣

補中益氣

加黃檗

代赭旋覆湯

升陽益胃湯

補脾胃瀉

生地湯

代赭旋覆湯

升陽益胃湯

補脾胃瀉

陰火升陽湯

橘皮竹茹湯

又橘皮

丁香柿蒂湯

卷一上

丁香柿蒂湯

又

四磨湯

五磨

舉元煎

獨

參湯

見救急門

保元湯

見嬰孩門

參朮膏

見補養門

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆蒼培同較
有杜雋望

成方切用

治氣門

天積氣爾地積形爾人氣以成形爾

山氣之關於形也豈不鉅哉然而身形之中
有營氣有衛氣有宗氣有臟腑之氣有經絡
之氣各為區分其所以統攝營衛臟腑經絡
而令克周無間者氣也氣者血之府也血者
全賴胸中神機化滅氣立孤危矣金匱曰營
衛升降息神機化滅氣立孤危矣金匱曰營

成方切用卷上

衛相得其氣乃行。大氣一轉。其氣乃散。見營衛兩不和諧。氣即痺而難通。必先令營衛相得其氣。並行不悖。然必俟胸中大氣一轉。其久病駁劣之氣始散。然則大氣之關於病機。若此。金匱獨窺其微。舉胸痺短氣心痛。獨發其義於一門。而治法以通胸中陽氣為主。蓋陽主開陽盛則有開無塞。爾若胸中之陽不虧。可損其有餘。則用枳朮湯足矣。用枳必與朮各半。可過損乎。識此以治胸中之病。寧不思過半乎。今人之暴其氣而不顧。迨病成復損其氣以求理。習用枳實枳殼。砂仁香附。橘皮。蘇子沉香。山查。檳榔。厚朴之屬。總由未識胸中大氣為生。而死第一關。爾。

西左魯九

栝蒌薤白白酒湯

金匱

治胸痺喘息欬唾胸背痛

短氣寸口脈沉而遲。關上小緊數。

徐忠可曰。人之胸中如天。

發交飲云
欬逆倚息
氣短不得
臥其形如
腫此胸痺

陽氣用事。故清肅時行。呼吸往還。不愆常度。津液上下。潤養無瘳。痺則虛而不充。其息乃不勻。而喘噓乃隨欬而生。胸為前背。為後。其中氣痺。則前後俱痛。上之氣不能常下。則下之氣不能時上。而短矣。寸口主陽。因虛伏而不鼓。則沉而遲。關主陰。陰寒相搏。則小緊而數。數者。陰中挾燥火也。故以栝蒌開胸中之燥。痺為君。薤白之辛溫。以行痺著之氣。白酒以通行營衛。為佐。其意謂胸中之陽氣布。則燥自潤。痰自開。而諸證悉愈也。寸口脈沉而遲。關上小緊數。既為胸痺。主脈又云。陽微陰弦。即胸痺而痛。孰為是乎。曰。此正見仲景斟酌論證之妙。蓋胸痺證。陽既虛。虛則不運。不運則津液必凝滯。而為痰。故胸痺本與支飲痰飲相類。但支飲痰飲。乃飲重而滯氣。胸痺則由陽虛而氣鬱。痰飲因之。故仲景既不一脈為言。而曰。夫脈當取太過不及。陽微陰弦。即胸痺而痛。又註云。責其極虛。見胸痺證。當

云喘息欬
喘胸背痛
短氣彼邪
重故不得
臥此虛故
前後胸背
應痛是大
別異

全責陽虛。既非表證。外入之疾。亦非痰飲內積
之比。故以栝蘆薤白潤燥通陽為主。未嘗不取
消痰下氣。而意實不同於治飲也。故細分寸口
沉遲者。約略言其脈之在陽者為微。細分關上
小緊數者。約略言其脈之在陰者為弦。當取太
過不及者。約略之辭也。令以陰陽樞審關前關
後。使人認定上焦。陽虛而胸痺一證。
與支飲痰飲等病。因治法判然矣。

栝蘆一枚 薤白三兩 白酒四升

此上焦膈中藥也。膈中。兩乳中間。經曰。膈中者。臣使之官。喜樂出焉。喻

嘉言曰。胸中陽氣如離。照當空曠。然無外。設地

氣一上。則窒塞有加。故知胸痺者。陰氣上逆之

候也。仲景微則用薤白白酒以益其陽。薤葉光滑。露亦

心條若無
心痛徹背

難竚。故曰薤露。其性滑泄。能通氣滯。故胸痺下重。竝用之。甚則用附子乾薑以消其陰。世醫不知胸痺爲何病。習用荳蔻木香訶子三稜神麴麥芽等藥。坐耗其胸中之陽。亦相懸矣。

加半夏名栝蒌薤白半夏湯。治胸痺不得臥。

心痛徹背。

徐忠可曰。胸痺而加以不得臥。此支飲由胸痺而痛。應背。故卽飲之兼證。又心痛徹背。支飲原不痛。

前方加半夏以去飲下逆。除白酒加枳實厚朴。

桂枝名枳實薤白桂枝湯。

金匱

治胸痺心中痞畱。

氣結在胸。胸滿脇下逆搶心。

徐忠可曰。胸痺而加以心中痞胸滿。

竟。是。支。飲。矣。

似。痞。與。結。胸。之。象。乃。上。焦。陽。微。而。客。氣。動。膈。也。
註。云。留。氣。結。在。胸。卽。客。氣。也。更。脇。下。逆。搶。心。是。
不。獨。上。焦。虛。而。中。焦。亦。虛。陰。邪。得。以。據。之。爲。逆。
爲。搶。故。於。薤。白。栝。蒹。又。加。枳。朴。以。開。其。結。桂。枝。
行。陽。以。疏。其。肝。又。曰。人。參。湯。亦。主。之。者。病。由。中。
虛。去。其。太。甚。卽。可。補。正。以。化。邪。也。胸。痺。之。虛。本。
陽。氣。微。非。營。氣。虛。也。陽。無。取。乎。補。宜。而。通。之。卽。
陽。氣。暢。暢。則。陽。盛。矣。故。薤。白。方。以。行。陽。爲。主。不。
取。補。也。此。曰。人。參。湯。亦。主。之。因。脇。下。逆。由。中。氣。
虛。故。兼。補。中。爾。人。參。湯。卽。理。中。湯。等。分。而。用。乾。
薑。者。爾。

四。君。子。湯。治。一。切。陽。虛。氣。弱。脈。來。虛。軟。脾。衰。肺。

損。飲。食。少。思。體。瘦。而。黃。或。痿。白。無。采。皮。聚。毛。落。言。語。

輕。微。四。肢。無。力。及。脾。胃。不。和。洩。痢。虛。飽。

人參 白朮土炒 茯苓錢二 甘草錢一 加薑棗

人參甘溫大補元氣爲君。白朮苦溫燥脾補氣爲臣。茯苓甘淡滲溼瀉熱爲佐。甘草甘平和中益土爲使。氣足脾運飲食倍進則餘臟受蔭而色澤身強矣。

加陳皮以理氣散逆。名異功散。錢氏調理脾胃再加半夏以燥溼除痰。名六君子湯。治脾胃氣虛飲食不進致成痰癖。不時咳唾。或胃氣虛寒動成嘔惡。凡虛瘡及諸病後。惟真陰虧損者大忌用此培土之劑以伐

腎。水。加。香。附。砂。仁。名。香。砂。六。君。子。湯。治。虛。寒。胃。痛。

或。腹。痛。泄。瀉。六。君。子。加。竹。瀝。麥。冬。治。四。肢。不。舉。

脾。主。四。肢。六。君。子。加。烏。梅。草。菓。等。分。薑。棗。煎。名。四。獸。

飲。以。三。因。和。四。臟。治。五。臟。氣。虛。七。情。兼。併。結。聚。痰。

飲。與。衛。氣。相。搏。發。為。瘧。疾。亦。治。瘡。癰。六。君。子。加。

柴。胡。葛。根。黃。芩。白。芍。名。十。味。人。參。散。治。虛。熱。潮。

熱。身。體。倦。怠。加。黃。耆。山。藥。亦。名。六。君。子。湯。為。病。

後。調。理。助。脾。進。食。之。劑。加。棗。仁。炒。治。振。悸。不。得。

眠。居。胡。治。加。薑。汁。竹。瀝。治。半。身。不。遂。在。右。者。屬。氣。

虛亦治痰厥暴死加木香霍香乾葛名七味白

朮散錢氏治脾虛肌熱泄瀉虛熱作渴參朮乾葛皆能生津

楊仁齋再加五味柴胡治消渴不能食除人參

加白芍名三白湯調理內傷外感治虛煩或渴

或泄加山藥藕豆薑棗煎名六神散陳無擇治小

兒表熱去後又發熱者世醫到此盡不能曉或用涼藥或再解表或

謂不治此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再熱非熱證也宜此湯加粳米和其胃氣則

收陽歸內而身涼矣然寒者加肉桂兼陰虛加熟地四君合四物名八珍

湯治氣血兩虛及胃損飲食不為肌膚若傷之

重者真陰內竭虛陽外鼓諸證蜂起則於四物四君之中又加黃耆以助陽固表加肉桂以引

火歸元名十全大補湯

金匱曰虛者十補勿一瀉之此湯是也

全大補加防風爲君再加羌活附子杜仲牛膝

名大防風湯治鶴膝風十全大補去川芎加陳

皮名溫經益元散

節巷

治汗後頭眩心悸筋惕肉

瞤或汗出不止或下後下利不止身體疼痛

太陽

宜汗汗多則以陽故有眩悸瞤惕之證陽明宜下下多則以陰故有下利身痛之證

補中益氣湯

東垣

治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡

寒懶言惡食脈洪大而虛氣短而渴或陽虛自

汗宜本湯加麻黃根浮小或氣虛不能舉元致

瘧痢脾虛久不能愈一切清陽下陷中氣不足

之證脾臟腑肢體皆稟氣於脾胃饑飽勞役傷其

陷則陰火上乘故熱而煩非實熱也頭者諸陽

之會清陽不升則濁氣上逆故頭痛其痛或作

或止非如外感常痛不休也陽虛不能衛外故

惡寒自汗氣虛故懶言脾虛故惡食脾胃虛則

火上干脾故短氣火剋金不能生水故渴脾虛

不能升舉則降多而升少致清陽下陷則為瀉

痢正虛邪陷則瘧不止。李東垣內傷外感辨

傷於飲食勞役七情六慾為內傷傷於風寒暑

溼為外感內傷發熱時熱時止外感發熱熱甚

不休內傷惡寒得煖便解外感惡寒雖厚衣烈

火不除。內傷惡風。不惡甚風。反惡隙風。外感惡風。見風便惡。內傷頭痛。乍痛乍止。外感頭痛。連痛無休。直待表邪傳裏方罷。內傷有溼。或不作渴。或心火乘肺。亦作燥渴。外感須二三日。外邪傳裏。口方作渴。內傷則風傷筋。寒傷骨。一身筋骨力。倦怠嗜臥。外感則風傷筋。寒傷骨。一身筋骨疼痛。內傷則短氣不足以息。外感則喘塞氣盛。有餘。內傷則手心熱。外感則手背熱。天氣通於肺。鼻者肺之外候。外感傷寒。則鼻塞。傷風則流涕。然能飲食。口知味。腹中和。二便如常。地氣通於脾。口者脾之外候。內傷則懶言惡食。口不知味。小便黃赤。大便或祕或溏。內傷證屬不足。宜溫。宜補。宜和。外感證屬有餘。宜汗。宜吐。宜下。若內傷誤作外感。妄發其表。重虛元氣。禍如反掌。故立補中益氣湯主之。又有內傷外感兼病者。若內傷重者。宜補養爲先。外感重者。宜發散爲急。此湯唯上焦痰嘔。中焦溼熱。傷食。膈滿者。不宜服。陰虛發熱者。宜養陰。忌服此湯。宜遵丹溪。

東垣取輕
清上升故
數分少立
齋每以濟
危急故隨
證加多

及養藥之法。若陰虛兼外感者。宜用補陰益氣煎等法。

黃耆蜜炙人參錢半甘草錢一白朮土炒陳皮留當

歸五分升麻錢半柴胡三分薑三片棗二枚方東垣原

止有一錢。其餘各三分。立齋常用。參者錢半。白

朮當歸一錢。陳皮七分。升柴五分。如病甚者。參

者或三錢五錢。隨證加用。高鼓峯曰。凡六經內

傷感證。及暑月勞倦發熱。汗出不止者。但用本

方。加白芍一錢。痢疾腹痛已除。瀉猶未止。是脾

氣下陷也。加酒炒白芍三錢。瘧疾發久。形體尪

羸。胃中有痰。飲者加半夏一錢。或內有火熱。可
加黃芩一錢。凡婦女胎前氣虛。以致胎動不安。
小產崩漏。或產後血虛發熱。但加酒炒白芍二
錢。此方凡屬中宮虛損。病後失調。無不相宜。倪
氏曰。七情內傷。脾胃先病。治先脾土。此方是也。
如血不足。加當歸精

神短少加人參五味肺熱咳嗽去人參乾噦加

葛根

風藥多燥葛根獨能止渴者以其能升胃中清氣入肺而生水爾

頭痛加

蔓荊子痛甚加川芎腦痛加藁本細辛風溼相

搏一身盡痛加羌活防風有痰加半夏生薑胃

寒氣滯加青皮薤仁木香益智腹脹加枳實厚

朴木香砂仁腹痛加白芍甘草熱痛加黃連能

食而心下痞加黃連咽痛加桔梗有寒加肉桂

溼勝加蒼朮陰火加黃檗知母陰虛去升柴加

熟地山茱山藥大便秘加酒煨大黃咳嗽春加

旋覆欬冬夏加麥冬五味秋加麻黃黃芩冬加
麻黃不去根節天寒加乾薑泄瀉去當歸加茯
苓蒼朮益智如冬月惡寒發熱無汗脈浮而緊
加麻黃若脈浮而緩有汗加桂枝芍藥東垣此
方原爲
感證中
有內傷
一種故
立此方
以補傷
寒書之
所未及
非補虛
方也今
感證家
多不敢
用而以
爲調理
補虛服
食之藥
則謬矣
調理補
虛乃通
其意而
轉用之
者爾

肺者氣之本黃耆補肺固表爲君脾者肺之母

土能生金脾胃人參甘草補脾益氣和中瀉火

爲臣東垣曰參耆甘草瀉火之聖藥蓋煩勞則
虛而生熱得甘溫以益元氣而虛熱自退

故亦謂之瀉。白木燥溼強脾。當歸和血養陰。為佐。補陽

宜兼和陰。不然則已亢。升麻以升陽明清氣。右升而復。其本位。柴

胡以升少陽清氣。左旋而行。陽升則萬物生。清升

則濁陰降。加陳皮者。以通利其氣。陳皮同補藥。則補獨用則

瀉脾。生薑辛溫。大棗甘溫。用以和營衛。開腠理。致

津液。諸虛不足。先建其中。中者何。脾胃是也。東垣

曰。脾胃虛者。因飲食勞倦。心火亢甚。而乘其土位。其次肺氣受邪。須多用黃耆。而人參甘草次之。脾胃一虛。肺氣先絕。故用黃耆以益皮毛。而固腠理。不令自汗。上喘氣短。故以人參補之。心火乘脾。用炙甘草溫。以瀉火熱。而補脾元。若脾胃急痛。并大虛腹中急縮。宜多用之。中滿者減。

之白朮苦甘溫。除胃中之熱。利腰臍間血。胃中清氣在上。必加升麻柴胡以升之。引參耆甘草甘溫之氣味上升。以補胃氣之散。而實其表。又緩帶脈之縮急。氣亂於中。清濁相干。用去白陳皮以理之。又助陽氣上升。以散滯氣。脾胃氣虛。為陰火傷其生發之氣。營血亦虧。血減則心無所養。致令心滿而煩。病名曰恍惚。故用甘辛微溫之劑。生陽氣。若虛煩不寧者。增人參補之。陽旺則能生陰血。或增當歸和之。少加黃蘗以救腎水。瀉陰中伏火。如煩猶不止。少加生地補腎水。水旺則心火自降。李士材曰。虛人感冒。不在發散者。此方可以代之。東垣曰。肌熱者。表熱也。服此湯一二劑。得微汗則已。非正發汗。乃陰陽氣和。自然汗出也。凡四時挾虛傷寒。通宜補散。故丹溪治傷寒。多用補中益氣湯。氣虛者。四君子加發散藥。血虛者。四物湯加發散藥。東垣治風溼。用補中益氣湯加羌活防風升麻。藁本蒼朮。海藏治風溼。無汗者。用神木湯。有汗者。用白

木湯治剛瘕。神木湯加羌活麻黃治柔瘕。白木湯加青木桂心治中弱。脈弦細乳遲者用黃耆湯。此皆非仲景成法。然對證則可用。亦不可廢也。明醫雜著云。發熱有數種。治各不同。仲景論傷寒傷風。此外感也。故宜發表以解散之。此麻黃桂枝之義也。感於寒冷之月。卽時病發。故用辛熱以勝寒。如春溫之月。則當變以辛涼之藥。夏暑之月。卽當變以甘苦寒之藥。又有冬溫。此天時不正。陽氣反泄。用藥不可溫熱。又有寒瘕。卻在溫熱之時。此陰氣反逆。用藥不可寒涼。又有瘟疫。沿門闔境相似者。此天地之厲氣。當隨時令。參氣運而治。宜辛涼甘苦寒之藥。以清熱解毒。若夫飲食勞倦爲內傷。元氣則真陽下陷。內生虛熱。故東垣發補中益氣之論。用甘溫之藥大補其氣。而提其下陷。此用氣藥以補氣之不足也。又有勞心好色。內傷真陰。陰血既傷。則陽氣偏勝。而爲虛熱。是謂陰虛火旺。勞瘵之證。故丹溪發陽有餘陰不足之論。用四物加知朮。

補其陰而火自降。此用血藥以補血之不足也。又有夏月傷暑之病。雖屬外感。卻類內傷。東垣所謂清暑益氣是也。又有因暑熱而過食冷物。以傷其內。或過取風涼。以傷其外。此則非暑傷人。因貪涼而致之病。治宜辛熱解表。辛溫理中。之藥。卻與傷寒治法相類者也。外感之與內傷。寒病之與熱病。氣虛之與血虛。如冰炭相反。治之若差。則輕病必重。重病必死矣。醫貫曰。讀傷寒書而不讀東垣書。則內傷不明。而殺人多矣。讀東垣書而不讀丹溪書。則陰虛不明。而殺人多矣。東垣脾胃論。漢明饑飽勞役發熱等證。俱是內傷。悉類傷寒。切戒汗下。以爲內傷多而外感少。只須溫補。不必發散。如外感多。內傷少。溫補中少。加發散。以補中益氣爲主。如內傷兼寒者。加麻黃。兼風者。加桂枝。兼暑者。加黃連。兼溼者。加羌活。實乃萬世無疆之利。此東垣特發陽虛發熱之一門也。然陰虛發熱者。十之六七。亦類傷寒。今人一見發熱。無不通用發散。發散而

斃則曰傷寒之法已窮予嘗於陰虛發熱者見
 其大熱而赤口渴煩躁與六味地黃湯一大劑
 即愈如下部惡寒足冷上部渴甚躁極或飲而
 反吐即加肉桂五味甚則加附子冷飲以此活
 人多矣此丹溪發明陰虛發熱之外尙遺未盡
 之旨也張景岳曰補中益氣湯之用原以治勞
 倦內傷發熱等證雖曰爲補氣也非發汗也然
 實有不散而散之意故於勞倦感寒或氣虛疹
 癰及脾氣下陷等證則最所宜也若全無表邪
 寒熱而但有中氣虧甚者則升柴之類大非所
 宜蓋以升柴味皆苦寒性專疎散雖曰能引清
 氣上升然惟有邪者固可因升而散之使或無
 邪能不因散而愈耗其中氣乎即曰此湯以補
 劑爲主而唯藉升柴以引達清氣不知微虛者
 猶可出人大虛者必難假借當此之時即純用
 培補猶恐不及而再兼疏泄安望成功且凡屬
 補氣之劑無不能升正以陽主升也用其升而
 不用其散斯得補陽之大法又奚必升柴之是

賴乎。故於諸證之中。凡其不宜用此者。則有不
可不察。如表不固而汗不斂者。不可用。外無表
邪而陰虛發熱者。不可用。陽氣無根而格陽戴
陽者。不可用。脾肺虛甚而氣促似喘者。不可用。
命門火衰而虛寒泄瀉者。不可用。水虧火亢而
吐血衄血者。不可用。四肢厥逆而陽虛欲脫者。
不可用。總之元氣虛極者。毫不可泄。陰陽下竭
者。毫不可升。真火虧敗者。毫不可用。清涼。今人
但知補中益氣湯可以補虛。一槩尙之。而不知
病當緊急。則此時幾微關係。判於一舉指之間。
而纖微不可紊。誤者。止此類也。

加炒芩神麴名益胃升陽湯治婦人經水不調

或脫血後食少水瀉

東垣曰脫血益氣古聖之法也故先補胃以助生發

之去白朮加草蔻神麴半夏黃檗名升陽順氣

湯治飲食勞倦所傷滿悶短氣不思食不知味

時惡寒東垣曰升麻柴胡味薄性陽引脾胃清氣行於陽道以滋春氣之和又引參耆

甘草上行充實腠理使衛外為固凡補脾胃之

藥多以升陽補氣名之者此也又曰但言補之

以辛甘溫熱之劑及味之薄者諸風藥是也此

助春夏之升浮者也此便是瀉秋收冬藏之藥

也在人之身乃肝心也但言瀉之以酸味寒涼

之劑并淡味滲泄之藥此助秋冬之沉降者也

此便是瀉春生夏長之藥也在人之身肺腎是

也吳鶴皋曰升柴辛甘升其清清升則陽氣順矣
柴皮苦寒降其濁濁降則陰氣順矣參耆當
歸甘草補其虛虛補則正氣順矣半夏陳皮利
其膈膈利則痰氣順矣荳蔻神
麴消其食食消則穀氣順矣
夏黃芩益智各三分名參朮益胃湯治內傷

倦燥熱短氣口渴無味大便溏黃除當歸白朮

加木香蒼朮名調中益氣湯治脾胃不調胸滿

肢倦食少短氣口不知味及食入反出加白芍

五味亦名調中益氣湯以上俱東垣方治氣虛多汗餘

治同前之此加白芍五味之酸以收耗散之氣

有發有收此東垣別開一路以廣補中之妙者乎加羌活防風細辛川

芩名調營養衛湯治勞力傷寒頭痛身熱惡

寒微渴汗出身痛脈浮無力加白芍細辛川芩

蔓荊名順氣和中湯治清陽不升頭痛惡風

脈弦微細加黃蘗生地名補中益氣加黃蘗生
地湯治陰火乘陽發熱晝甚自汗短氣口渴無
味

代赭旋覆湯仲景

治傷寒發汗若吐若下解後心

下痞更噫氣未除

汗吐下後大邪雖解胃氣弱而不和虛氣上逆故痞鞭噫

氣即俗所謂噯氣也

并善治反胃噎食氣逆不降

旋覆花

甘草三兩

半夏半升

人參二兩

代赭石二兩

生

薑五兩

大棗十二枚

喻嘉言曰此亦伏飲為逆但因胃氣虧損故用

法以養正而兼散餘邪。大意在噫氣不除。上既
心下痞硬。更加噫氣不除。則胃氣上逆。全不下
行。有升無降。所謂弦絕者。其聲嘶。土敗者。其聲
噦也。故用代赭。領人參。納氣歸元海。以鎮安其
逆。微加散邪。滌飲而痞自開。爾成氏曰。韋則氣
堅。旋覆之鹹。以
軟痞。韋。怯。則氣浮。代赭之重。以鎮虛逆。辛者。散
也。生薑。半夏之辛。以散虛痞。甘者。緩也。人參。大
棗。甘草之甘。以補胃弱。綱目曰。病解後痞。韋。噫
氣不下。利者。用此湯。下利者。生薑瀉心湯。活人
云。有旋覆代赭證。或咳逆。氣虛者。先服四
逆湯。胃寒者。先服理中湯。後服此湯。為良。

升陽益胃湯

東垣

治脾胃虛弱。怠惰嗜臥。時值秋

燥令行溼熱方退。體重節痛口苦舌乾心不思食。食不知味大便不調小便頻數兼見肺病灑淅惡寒慘慘不樂乃陽氣不升也。

黃耆二兩半夏 甘草炙人參一兩白芍炒羌活

獨活 防風五錢以其秋旺陳皮四錢白朮土炒

茯苓湯者勿用澤瀉無淋勿用柴胡三錢黃連二錢每

三錢薑棗煎列證云治秋燥此方殊為不介

六君子助陽益胃補脾胃之上藥也加黃耆以補肺而固衛芍藥以斂陰而調營羌活獨活防

風柴胡以除溼痛

羌活除節之痛

而升清陽茯苓澤

瀉以瀉溼熱而降濁陰

少佐黃連以退陰火補

中有散發中有收使氣足陽生自正旺而邪服

矣

東垣曰此治脾胃兼肺病也何故秋旺用參朮芍藥之類反補脾為脾胃虛則肺俱受病

故因時而補易為力也又曰予病脾胃久衰一日體重肢節疼痛大便泄下小便閉塞默思內

經云在下者因而竭之是先利小便也又治諸瀉小便不利者先分利之治溼不利小便非其

治也常用淡滲之劑又思聖人之法雖布在方策其未盡者以意求之今寒溼客邪自外入裏

而甚暴若用淡滲以利之病雖即已降之矣又降復益其陰而重竭其陽也治以升陽風藥是

為宜爾羌活獨活升麻柴胡各一錢防風炙甘草各五分一劑而愈大法寒溼之勝風以平之

又曰。下者舉之。聖人之法。舉一可知百矣。東垣又曰。藥中但犯澤瀉。豬苓。茯苓。木通。燈草。淡味。滲洩之類。皆從時令之旺氣。以泄脾胃之外邪。而補金水之不足也。或小便已數。肝腎不受邪者。而誤用之。必大瀉真陰。竭絕腎水。先損其兩目也。又云。靈樞云。頭有疾。取之足。謂陽病取陰也。足有疾。取之上。是陰病取陽也。中有疾。旁取之。中者。脾胃也。旁者。少陽甲膽也。甲膽。風木也。東方春也。胃中。穀氣者。便是風化也。胃中溼勝。而成泄瀉。宜助甲膽風勝以克之。又是升陽助清氣上行之法也。

補脾胃瀉陰火升陽湯

東垣

治飲食傷胃勞倦傷

脾火邪乘之而生大熱右關脈緩弱

虛脾或弦木

尅木

土

或浮數

東垣曰。溼熱相合。陽氣日虛。不能上升。脾胃之氣。下流肝腎。是有秋冬而

無春夏也。惟瀉陰火，升陽氣，用味薄風藥升發，則陰不病而陽氣生矣。

黃耆 蒼朮酒炒 甘草炙 羌活一兩 升麻八錢 柴胡

兩半 黃連五錢 黃芩炒 人參七錢 石膏長夏用 每

服三錢或五錢

柴胡升麻羌活助陽益胃以升清氣人參蒼朮

黃耆甘草益氣除溼以補脾胃黃芩黃連石膏

涼心清熱以瀉陰火東垣曰胃乃脾之剛脾乃胃之柔飲食不節則胃先

病脾無所稟而後病勞倦則脾先病不能為胃行氣而後病胃為十二經之海脾胃既虛十二

經之邪不一而出假令不能食而肌肉削此本病也右關脈緩而弱本脈也或本脈中兼見弦

脈證中或見四肢滿悶淋瀝便難轉筋一二證此脾胃兼肝病也當加風藥以瀉之脈中兼見洪大證中或見肌熱煩熱面赤肉消一二證此脾胃兼心病也當加瀉心火之藥脈中兼見浮濇證中或見短氣氣上喘咳痰盛皮澀一二證此脾胃兼肺病也當加泄肺及補氣之藥脈中兼見沉細證中或見善欠善恐一二證此脾胃兼腎病也當加瀉腎水之浮及瀉陰火之藥蓋百病皆從脾胃生也處方者當從此法加時令藥

橘皮竹筍湯

金匱

治久病虛羸嘔逆不已

胃寒則嘔胃熱

亦嘔有停痰有積飲皆作嘔此為久病虛火上逆而乾嘔者

亦治吐利後胃

虛噦逆

橘皮

竹筍

升

甘草

兩

人參

兩

生薑

半

大棗

十三

故

徐忠可曰此胃虛而冲逆爲噦然非真元衰弱之比故以參甘培胃中元氣而以橘皮竹筴一寒一溫下其上逆之氣以薑棗宣其上焦使胸中之陽漸暢而下達謂上焦固受氣於中焦而中焦亦稟承於上焦上焦既宣則中氣自調也加半夏麥冬赤茯苓杷葉亦名橘皮竹筴湯

丁香柿蒂湯

嚴氏

治久病呃逆因於寒者

呃在中焦穀氣

不運。聲短小。得食即發。爲胃呃。呃在下焦真氣不足。其聲長大。不食亦然。爲腎呃。久呃則胃

腎俱寒者。為多此病。有因痰阻氣滯者。有因瘀血者。有因火鬱者。有因胃實失下者。此皆屬實。有因中氣大虛者。有因大下胃虛。陰火上逆者。此皆屬虛。寒熱虛實。治法不一。古方以此湯治寒。

丁香

柿蒂

錢二

人參

錢一

生薑

片五

一方

加陳皮

半夏 茯苓 甘草 良薑

丁香泄肺溫胃而煖腎。生薑去痰開鬱而散寒。

柿蒂苦瀉而降氣。人參所以輔真氣。使得展布。

也。

朱丹溪曰。人之陰氣。因胃為養。土傷則木挾相火。直冲清道而上。作呃逆。古人以為胃寒。

用丁香柿蒂。不能清痰利氣。惟助火而已。李時珍曰。朱氏但執以寒治熱。矯枉之過矣。按古人

治陰呃。每用桂附乾薑吳萸丁香茴香諸辛熱藥。多有收效者。治陽呃。用橘紅竹茹湯。土機微義曰。呃逆本由陰氣已虛。陽火暴甚。直衝而上。出於胃。入於肺。而作聲。東垣用涼藥者。所以瀉熱降火也。若陰證呃逆。以陰氣先消。陽火亦竭。浮於胸中。亦欲散也。故不用寒藥。而反以溫藥養胃。留其陽氣。胃氣和。則愈。陽生則陰長之說也。

除人參生薑加竹茹橘紅名丁香柿蒂竹茹湯

又名橘紅竹茹湯治陽呃。或問治陽呃者。何以不用知藥。吳鶴皋曰。

此少陽虛邪。非實邪也。故用柿蒂竹茹之味薄者主之。若知藥味厚。則益戕其中氣。否塞不益甚乎。古人蓋除人參生薑亦名丁香柿蒂湯嚴氏

淡權之矣。寶鑑去人參加青皮陳皮三因去人參加良薑

甘草名丁香散

四磨湯嚴氏

治七情氣逆上氣喘急妨悶不食怒則

氣上思則氣結憂愁不已氣多厥逆重則眩仆輕則上氣喘急滿悶妨食

檳榔 沉香 烏藥 人參 等分濃磨煎三

四沸溫服 一方人參易枳殼一方去參加枳

實木香白酒磨名五磨飲治暴怒卒死名曰氣厥

氣上宜降之故用檳榔沉香檳榔性如鐵石沉

能下氣逆宜順之故用烏藥加入人參者降中有

升瀉中帶補恐傷其氣也

舉元煎景岳

治氣虛下陷血崩血脫亡陽垂危等

證有不利於歸熟等劑而但宜補氣者以此主之

黃耆

炙人參

三五錢白朮

炒甘草

炙二錢

升麻

炒五分

如兼陽氣虛寒者桂附乾薑隨宜佐用如兼滑脫者可加烏梅二箇或文蛤七八分

獨參湯

諸虛氣弱脈微危急及大失血者此方

主之

血脫者須益其氣蓋有形之血不能速生無形之氣所當急固陽生則陰長也

痰者

或加薑汁或竹瀝

煩躁者加童便

虛而有火

身寒者加附

成方切用

氣

卷上

舉元煎

獨參湯

六

子

人參得天地冲和之氣以成形。故用之以補冲和之氣。使其一息尚存。則可以次第而療諸疾。是以病之危急而虛者。良醫以氣爲首務也。

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷一下

理血門 正方三十一
附方三十四

四物湯

知藥四物湯
二連四物湯

滋陰降火湯
三黃四物湯

坎離丸
三黃補血

湯元戎

四物湯
治風六合湯

補肝丸
四神

治

氣六合湯

神應養真丹

防風當歸散

抵當丸

湯艾附

煖宮丸
婦寶丹

歸風當

抵當丸

芳湯

生地黃連湯
玉燭散

抵當湯

抵當丸

當桃仁

承氣湯
桃仁承

蒼朮地榆湯

芍藥地

丸導滯

秦艽白朮丸

秦艽當歸湯

秦艽羌活湯

湯導滯

秦艽防風湯

秦艽蒼朮湯

秦艽羌活湯

麻黃人參芍藥湯

當歸補血湯

槐花散 加減

成方切用血 卷一下 目錄

湯花散 槐角丸 又槐 咳血方 龍腦雞蘇丸 犀

角地黃湯 加味犀角 歸脾湯 酸棗 人參養營湯

養心湯 還元水 迴輪 獨聖散 清咽太平丸

小薊飲子 復元羌活湯 補陰益氣煎 四生

丸 當歸六黃湯

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭

男

有榆蒼培同較
有杜雋望

成方切用

理血門

人有陰陽。卽爲血氣。陽主氣。故氣全

所賴。惟斯而已。蓋其源源而來。生化於心。總
統於脾。藏受於肝。宣布於肺。施泄於腎。灌溉
一身。凡爲七竅之靈。爲四肢之用。爲筋骨之
和柔。爲肌肉之豐盛。以至滋臟腑。安神魂。潤
顏色。充營衛。津液得以通行。二陰得以條暢。
凡形質所在。無非血之用也。人有此形。惟賴

此血故血衰則形萎。血敗則形壞矣。然血化於氣而成。於陰陽虛固不能生血。所以血宜溫而不宜寒。陽亢則最能傷陰。所以血宜靜而不宜動。此盈虛性用之機。苟能察其精義而治得其宜。又何血病之足慮。如熟地當歸。枸杞鹿膠。山萸血虛所宜。生地芍藥阿膠血熱所宜。梔子犀角血之太熱所宜。桃仁紅花蘇木丹皮血瘀所宜。乳香沒藥五靈脂凌霄花血瘀而痛所宜。丹參益母草醇酒血滯所宜。升麻川芎白芷血陷所宜。棕灰髮灰白芨宜。升麻倍子血滑所宜。乳酪酥油柏子仁菴蓉血燥所宜。薑桂血寒所宜。人參白朮黃耆甘草氣虛不能生血及不能攝血所宜。苟能觸類而長之。可以應無窮之變矣。

四物湯

治一切血虛及婦人經病

月經先期為

陽為虛為鬱為痰。丹溪曰。經水者陰血也。陰必從陽。故其色紅。上應於月。其行有常。故名曰經。為

氣之配。因氣而行。成塊者。氣之凝。將行而痛者。氣之滯。行後作痛者。氣血俱虛也。色淡亦虛也。錯經妄行者。氣之亂。紫青氣之熱。黑則熱之甚也。今人見紫黑作痛成塊。率指為風冷乘之。而用溫熱之劑。禍不旋踵矣。經曰。亢則害。乘乃制。熱極則兼水化。所以熱則紫。甚則黑也。若曰風冷。必須外得。設或有之。十不一二也。玉機微義曰。寒則凝而不行。既行而紫黑。故知非寒也。

當歸洗酒生地錢三芍藥錢二芩薊錢半如涼血心加

黃連肝條芩肺枯芩大腸實芩膽黃連腎膀胱

黃蘗脾生地胃大黃三焦地骨心包絡丹皮小

腸梔子木通如清氣心與包絡加麥冬肺枳殼

肝柴胡青皮脾白芍胃乾葛石膏大腸三焦連

翹小腸赤茯苓滑石琥珀血虛加龜板血燥
加人乳血瘀加桃仁紅花韭汁童便行之暴血
加薄荷元參散之血不止加炒蒲黃京墨久不
止加升麻引血歸經婦人經血紫黑脈數爲熱
加芩連血淡脈遲爲寒加桂附人肥有痰加半
夏南星橘紅人瘦有火加黑梔知母黃蘗鬱者
加水香砂仁蒼朮神麴瘀滯加桃仁紅花延胡
肉桂氣虛加參耆氣實加枳朴以上乃舊時加
用法切不可執
當歸辛苦甘溫入心脾生血爲君生地甘寒入

心腎滋血爲臣。芍藥酸寒入肝脾斂陰爲佐。芍

藥辛溫通上下而行血中之氣爲使也。川芎入

包肝經上行頭目下行血海。玉機微義曰。川芎

血中之氣藥也。通肝經。性味辛散。能行血滯於

氣也。芫黃血中血藥也。通腎經。性味甘寒。能補

真陰之虛也。當歸血中主藥也。通肝經。性味辛

溫。分三治。全用活血。各歸其經也。芍藥陰分藥

也。通脾經。性味酸寒。能和血治血虛腹痛也。此

特血病而求血藥之屬者也。若氣虛血弱。又當

從長沙血虛以人參補之。陽旺即能生陰血也。

丹溪治陰虛發熱於血藥四物湯亦分陰陽血

之動者爲陽。歸芎主之。血之靜者爲陰。地芍主

之。血之陰不足。雖芎歸辛溫亦不用。血之陽不

足。雖薑桂辛熱亦用之。與瀉火之法。正治從治

相同。吳鶴皋曰。地芍養五臟之陰。芎歸調營中

之氣。陰陽調和而血自生。若失血太多。氣息幾

微之際。慎勿與之。蓋四物陰類。非所以生。物者。也。當重用。參。耆。以固。欲絕之氣。故曰。脫血者。先益其氣。否則。川芎。香。竄。反能耗氣。氣血雙亡。而死矣。故凡胃虛氣弱之人。皆不宜服。丹溪謂產後忌用芍藥。恐酸寒伐生生之氣。然芍藥。額治血虛氣痛。新產正血虛氣痛之時。醇酒微炒。用之。討害。又血塊凝滯作禍。不可泥於產後大補氣血。放膽用之。用玉燭散。無妨。推陳致新。亦是補法。只因產後大補氣血。一語。致積血而殞者多矣。張景岳曰。治血之劑。古人多以四物湯為主。然亦有宜有不宜。蓋補血行血。無如當歸。但當歸之性動而滑。凡因火動血者。忌之。因火而嗽。因淫而滑者。皆忌之。行血散血。無如川芎。然川芎之性升而散。凡火載血上者。忌之。氣虛多汗。火不歸原者。皆忌之。生血涼血。無如生地。敏血清血。無如芍藥。然二物皆涼。陽虛者。非宜也。脈弱身涼。多嘔便澀者。皆非宜也。故凡用四物以治血者。不可不察其宜否之性。

加黃檗知母名知檗四物湯再加參名滋陰

降火湯治陰虛有火知檗四物蜜丸名坎離丸

治陰虛嗽血丹溪論癆瘵主乎陰虛蓋自子至

在午後子前寐屬陽寐屬陰陰虛則盜汗從寐

時出升屬陽降屬陰陰虛則氣不降痰涎上逆

吐出不絕脈浮屬陽沉屬陰陰虛則浮之洪大

沉之空虛宜用四物竹瀝加炒檗龜板補陰降

火之劑又須遠嗜欲薄滋味靜心調養以助之

準繩云丹溪治癆瘵主乎陰虛用四物加知檗

主之世醫遵用百無一效何哉蓋陰虛火必上

炎當歸辛溫非滋虛降火之藥川芎上竄非虛

炎短乏者所宜地黃泥隔非胃弱痰多食少者

所宜知檗辛苦大寒雖曰滋陰其實燥血雖曰

降火久而增氣反能助火至於敗胃所不待言

不若用薏仁百合天冬麥冬桑皮地骨棗仁北

味批杷葉之類佐以生地汁藕汁人乳童便等
如咳嗽則多用桑皮枇杷葉有痰增貝母有血
增薏仁百合阿膠熱甚增地骨食少增薏仁至
七八錢而麥冬常爲之主以保肺金而滋化源
無不輒效又曰虛勞之疾百脈空虛非黏滯之
物填之不能實也精血枯涸非濡溼之物滋之
不能潤也當用參耆地黃二冬枸杞五味之屬
各煎膏另用青蒿以童便熬膏合前諸汁并麋
角膠霞天膏化服大抵薏仁百合之屬治肺虛
參耆地黃膏之類治腎虛蓋心肝屬陽肺腎屬
陰補肺腎卽是補陰加黃連胡黃連名二連四
非知槩四物之謂也

物湯

元戎

治氣旺血虛五心煩熱熱入血室夜分

發熱

血室衝脈也衝爲血海晝靜夜劇陽陷陰中名熱入血室

加黃槩黃芩

甘草名三黃四物湯治陰虛潮熱用生熟二地

加黃耆丹皮升麻柴胡名三黃補血湯治亡血

血虛六脈俱大按之空虛二地補血丹皮涼血黃耆補氣升柴升陽

陽旺則能生血也。加桃仁紅花名元戎四物湯治血結

便秘撲損瘀血加羌活防風秦艽用名治風六合

湯治風虛眩暈風秘便難蜜丸名補肝丸肝以散為

補。加木香檳榔名治氣六合湯治血虛氣滯或

血氣上衝加羌活天麻蜜丸名神應養真丹治

足厥陰經受風寒暑溼癱瘓不遂語言蹇澀及

血虛腳氣加桃仁紅花竹瀝薑汁治半身不遂

在左者屬瘀血

瘀血不去則新血不生故用桃仁紅花活血去瘀加薑汁竹瀝

者以痰無分左右也

去白芍加防風名防風當歸散治發

汗過多而成瘕證宜去風養血去地黃加乾薑

名四神湯治婦人血虛心腹疴痛

疴音鴉又音絞急痛也

加艾葉四製香附

童便鹽水酒醋各浸三日

醋丸名艾附煖

宮丸治子宮虛冷再加阿膠名婦寶丹治虛寒

月水不調加丹皮地骨治婦人骨蒸除芍藥地

黃名歸芎湯為末名佛手散又名一奇散又名

君臣散治產後血虛頭痛胎動下血服此即安

男子去血
過多亦有
此證

子死腹中服此卽下。催生神效。四物各七錢加
防風一兩。梔子黃芩黃連各三錢。每服五錢。如
脈實加大黃。名生地黄連湯。海藏治婦人血風證。
去血過多。因而燥渴。循衣摸牀。撮空閉目。揚手
擲足。錯語失神。脈弦浮而虛。陶節菴曰。大承氣
之內者用之。生地黄連湯。血藥也。自內而之外。而
者用之。氣血合病。循衣摸牀。證同。自氣之血。血
而復之。氣者。大承氣湯下之。自血之氣。氣而復
之。血者。生地黄連湯主之。二者俱不大便。此是
承氣湯對子。又與三黃石膏湯相表裏。是皆三
焦包絡諸火之病也。病既危急。只得以此降血
中。之。伏。火。爾。綱。目。曰。四物與桂枝麻黃白虎
柴胡理中四逆茶黃承氣涼膈等皆可作各半

湯此易老用藥大略也

加大黃芒硝甘草當歸用尾芍藥

用赤名玉燭散和子治經閉腹痛體瘦善饑取爾

時和氣謂之玉燭之義也

抵當湯

仲景

治太陽病六七日表證仍在

發熱惡寒頭痛

項脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下

焦少腹當鞭滿小便自利者必有畜血令人善

念所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也

太陽為經

膀胱為腑此太陽熱邪隨經入腑熱與血搏故為畜血脈沉為在裏表證仍在則邪氣猶淺不結於胸中而發狂經曰熱結膀胱其人如狂又曰血併於下亂而善忘小腹鞭滿而小便不利

者。爲溺澀。鞭滿而小便利者。爲畜血。準繩曰。玩
仍在二字。則邪氣爲不傳裏。非猶淺也。膀胱爲
太陽本經。曰熱結下焦。曰少腹鞭滿。曰小便自
利。皆膀胱之證。故總結曰。隨經滲熱也。在裏二
字。乃隨經膀胱之裏。非三陰之裏也。按太陽在
陽在表。縱有沉緊沉滑之脈。皆不得以裏陰名
之。

水蛭

三十箇豬脂熬黑

蝱蟲

三十箇去頭足剋

桃仁

二十枚去皮尖研

大黃

酒浸四兩

苦走血

鹹滲血

蝱蟲

水蛭

之

苦鹹

以除畜血

甘

緩急

苦泄熱

桃仁

大黃

之

甘苦

以下

結熱

程郊

表證仍在。脈微而沉。是有表證。而無表脈。熱在下焦。可知。非桂枝所能散。桃仁所能攻。緣熱結

二七
桃仁承氣湯與抵當湯攻有緩急。故

減水蛭十箇。蟅蟲桃仁各減五箇。分爲四丸。每

水煮一丸。名抵當丸。治本病無喜忘如狂之證。

者。附代抵當丸。大黃兩四生地歸尾桃仁穿山

甲元明粉各一兩桂心三錢蜜丸桃仁歸尾生地潤

動之。大黃元明粉苦寒鹹寒以推蕩之。如穿山甲引之以達於瘀所也。

桃仁承氣湯景仲治傷寒外證不解。熱結膀胱。小

腹脹滿。大便黑。小便利。燥渴譫語。畜血發熱如

狂。及血瘀胃痛。腹痛脇痛。瘧疾實熱。夜發。痢疾。

痰滿亦有
在上焦者

畜血急痛

熱邪自太陽不解傳入膀胱之府與血相搏若血自下則熱隨血出而愈

不下者血畜下焦故小腹急脹皮見青紫筋大
便黑者瘀血也小便便利者血病而氣不病也小
便利而少腹仍急故知為畜血心主血邪熱上
干心君不寧故躁煩譫語而如狂瘀血聚於陽
明則胃痛在太陰則腹痛在厥陰則脇痛瘧夜
發者熱入血分也活人云不當汗而汗之亡其
津液陽擾之極則侵陰也故燥血畜於胸中也
李挺曰太陽證則如狂陽明證則善忘少陽證
則寒熱如瘧傷寒有用大承氣不解反便堅善
食者瘀血也凡胸中滿心下滿者皆氣也腹中
滿者或燥矢或宿食少腹滿者或瀉或血停畜
而脹滿也清陽出上竅故上滿者為氣多濁陰
出下竅故下滿者為血多俱是熱病惟冷結
膀胱少腹滿一證為寒有手足厥冷為可辨

桃仁

五十枚去
皮尖研

大黃四兩
芒硝

甘草

桂枝二兩

或方切用

血

卷下

桃仁承氣湯

八

大黃芒硝蕩熱去實。甘草和胃緩中。此調胃承
氣湯也。熱甚則搏血。血聚則肝燥。故加桃仁之
甘苦以潤燥而緩肝。加桂枝之辛熱直達瘀所
而行之也。櫻寧生曰。血溢血泄。諸畜妄者。其始
其銳氣。然後區別治之。或問失血復下。虛何以
當。伊舉曰。血既妄行。迷失故道。不去。畜利瘀。則
以妄爲常。何以禦之。且去者自去。生者自生。何
虛之有。喻嘉言曰。用桃仁以達血所。加桂枝以
解外邪。亦猶大柴胡湯用柴胡解外相似。益見
太陽隨經之邪。非桂枝不解。爾程郊倩曰。五苓
散與桃仁承氣均爲太陽犯府之藥。一利
前而主氣分。一利後而主血分。治各不同。
節菴加青皮枳實當歸芍藥蘇木汁柴胡名桃

仁承氣對子

加青皮枳實破血必行氣也加當歸芍藥去瘀而生新也柴胡平肝

升清而散表熱蘇木助桃仁桂心以逐瘀血

蒼朮地榆湯

古潔

治脾經受溼痢疾下血

蒼朮

三兩

地榆

炒黑一兩

每一兩煎

蒼朮燥溼強脾升陽而開鬱地榆清熱涼血酸

收而斷下為治血痢腸風之平劑初起者勿用

加芍藥阿膠卷柏名芍藥地榆湯

河間

治泄痢膿

血乃至脫肛

阿膠補血與液為肺大腸要藥能治熱痢

芍藥湯

古潔

治下痢膿血稠黏腹痛後重

下痢皆屬溼熱

赤為傷血。白為傷氣。膿血稠黏。氣血兩傷也。腹
痛後重。氣血皆滯也。劉河間曰。行血則膿血自
愈。調氣則後重自除。

芍藥兩一歸尾

黃芩

黃連

大黃

錢三木香

甘草

炙

檳榔

二錢

桂

半錢

每服五錢

痢不減

加大

黃

此為實熱者言也。然
今之實熱者鮮矣。

芍藥

酸寒

瀉肝火

斂陰氣

和營衛

故以為君

大

黃歸尾

破積

而行血

木香

檳榔

通滯

而行氣

黃

芩黃連

燥溼

而清熱

痢由溼熱

積於腸胃

不得

宣通

故大便秘重

宣通

故大便秘重

急小便赤澀

也辛以散之

苦以

宣通

故大便秘重

急小便赤澀

燥之寒以清之甘以調之加肉桂者假其辛熱以爲反佐也

除桂甘草加枳殼名導滯湯一作導氣湯治前證兼

渴者此方今人多用僅遇虛寒者而誤用之禍不旋踵矣

秦艽白朮丸東垣治痔瘡痔漏有膿血大便燥結

痛不可忍手陽明大腸庚金也清燥主收司行

二陰之安
名錄

化萬物人或醉飽入房酒熱畱著忍精不泄流注纂問前陰之氣歸於大腸木乘火勢而侮燥金火就燥則大便秘閉而痔作矣受病者燥氣也爲病者胃溼也溼熱風燥四氣合邪法當瀉火潤燥疏風和血止痛

桃仁

研

歸尾

洗酒

秦艽

白朮

兩

枳實

炒

皂角子

燒存性

澤瀉

錢五

地榆

錢三

麴糊丸

秦艽歸尾桃仁潤燥和血

秦艽爲風藥中潤劑

皂角仁以

除風燥地榆以破血止血枳實苦寒以泄胃實

澤瀉鹹泄使氣歸於前陰以清溼邪也白朮之

苦甘以瀉火而益元氣故曰甘寒瀉火乃假枳

實之寒也大便秘澀以大黃推蕩之其津液益

不足用當歸和血加油潤之劑自然與利矣

除地榆加大黃紅花名秦艽當歸湯治痔漏大

便燥結疼痛用秦艽一味加羌活防風麻黃升

麻柴胡藁本細辛黃耆炙草紅花名秦艽羌活

湯治痔漏成塊下垂不任其癢除皂角枳實地

榆加防風升麻柴胡陳皮大黃黃蘗紅花炙草

名秦艽防風湯治痔漏大便時疼痛東垣曰如無痛者非

痔漏也。除白朮枳實地榆加蒼朮黃蘗大黃檳榔

防風名秦艽蒼朮湯以上俱治同東垣曰腸頭

作大痛者風也大便燥結者兼受火熱也是溼熱風燥四氣合邪當去四者以破氣藥兼之治

法全矣

麻黃人參芍藥湯

東垣

治吐血外感寒邪內虛蘊

熱

麻黃

去外寒

黃耆

實表益衛

甘草

炙補脾

白芍藥

安太陰各一錢

人參

益元氣而實表

麥冬

保肺氣各三分

五味子

五粒安肺氣

當歸

和血養血

桂枝

和營衛各五分

熱服

綱目曰觀此一方足以爲萬世模範矣蓋取仲

景麻黃湯與補劑各半服之但凡虛人當服仲

景方者宜以此爲則

東垣治一貧士病脾胃虛與補藥愈後繼居曠室臥

熱炕咳而吐血東垣謂此久虛弱冬居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪

不得舒伸。故血出於口。當補表之陽。瀉裏之虛。熱因思仲景治傷寒。脈浮緊。當以麻黃湯發汗。而不與之。遂成衄血。卻與麻黃湯立愈。與此甚同。因作此湯。一服而愈。

當歸補血湯

東垣

治傷於勞役。肌熱面赤。煩渴引

飲。脈大而虛。

飽血盛。則身涼。血虛。則身熱。此以饑

熱煩渴。與陽明白虎證無異。但白虎證得之外感。實熱內盛。故脈大而長。按之有力。此證得之內傷。血虛發熱。脈洪大而無力。內經所謂脈虛。血虛是也。誤服白虎湯。必斃。

黃耆

炙一兩

當歸

酒洗二錢

空心服

當歸滋陰養血。黃耆乃補氣之藥。何以五倍於當歸。而云補血湯乎。蓋有形之血。生於無形之

氣又有當歸為引則從之而生血矣。經曰陽生則陰長。此其義爾。

槐花散

本

治腸風臟毒下血

血之在身有陰有陽陽者順氣而行

循流脈中調和五臟。麗陳六腑。謂之營血。陰者居於絡脈。順守臟腑。滋養神氣。濡潤筋骨。若感內外之邪而受傷。則或循經之陽血。至其傷處為邪氣所阻。漏泄經外。或居絡之陰血。因重著之。邪滯裂而出。則皆滲入腸胃而泄矣。世俗率以腸風名之。不知風乃六淫之一爾。若腸胃受火熱。二淫與寒燥淫。拂鬱其氣。及飲食勞力傷其陰絡之血者。亦可謂之腸風乎。針經曰。陽絡傷。則血外溢而吐衄。陰絡傷。則血內溢而便溺。戴氏以隨感而見。色鮮者為腸風。積久而發。色瘀者為藏毒。又云。色鮮為熱。自大腸氣分來。色瘀為寒。自小腸血分來。或曰。腸風者。風邪淫胃。

藏毒者溼邪淫胃。藏毒腸風之血。出於臍腹之間。五痔之血。出於肛門蝕孔處。治各不同。

槐花炒側柏葉杵荆芥炒枳殼炒等分爲末

每服三錢米飲下

側柏養陰燥溼最清血分槐花疏肝瀉熱能涼

大腸荆芥散瘀搜風爲風病血枳殼寬腸利氣

此病多由溼熱風燥之邪。如久不愈者。不宜純用寒涼。須兼溫補。及升舉藥。大法涼血。用槐角

地榆。側柏。條芩。炒連。梔子。生地。和血。用阿膠。當歸。川芎。白芍。風溼。用秦艽。防風。荆芥。蒼朮。茯苓。

血瘀。少加桃仁。紅花。蘇木。寬腸。用枳殼。升舉。用升麻。補氣。生血。加人參。黃耆。白朮。甘草。

加當歸。生地。川芎。入烏梅。生薑。煎名加減四物

湯濟生治同補血除柏葉荆芥加當歸黃芩防風

地榆酒糊丸名槐角丸局方治同涼血疏風除柏葉枳

殼加青皮等分亦名槐花散潔古治血痢腹不痛

不裏急後重除柏葉枳殼加當歸川芎熟地白

朮青皮升麻亦名槐花散又名當歸和血散東垣

治腸澼下血溼毒下血經驗方單用槐花荆芥

炒黑為末酒服亦治下血

咳血方丹溪治咳嗽痰血咳者有聲無物嗽者有物

肺主氣氣逆為咳腎主水水泛為痰腎脈上入

肺循喉嚨其支者從肺絡心屬胸中故病則俱
病也。涎唾中有少血散漫者此腎從相火炎上
之血也。若血如紅縷從痰中咳出者此肺絡受
熱傷之血也。若咳出白血淺紅色似肉似肺者
必死。凡唾中帶血咯出有血或血絲屬腎經
鼻衄出血咳嗽有血屬肺經。嘔吐成盆成碗者
屬胃經。陽明多血多氣故也。自兩脇逆上吐出
者屬肝經。湯血屬小腸膀胱經。下血屬大腸經
牙宣出血屬胃腎虛火。舌血謂之舌衄。汗孔出
血謂之肌衄。心與肝也。又驚悸動血者屬肺。思
而動血者屬脾。勞而動血者屬腎。思

青黛

飛水

栝萋仁

去油

海石

去砂

山梔

炒黑

訶子肉等

分爲末蜜丸嚙化嗽甚加杏仁

肝火上逆能燥肺金故咳嗽痰血青黛瀉肝而

理血散五臟鬱火。梔子涼心。蒲青肺使邪熱下行。二者所以治火。枯萁潤燥滑痰。為治嗽要藥。能清上焦痰火。海石軟堅止嗽。清水之上源。能蕩除鬱熱垢膩。嗽止。二者降火而兼行。痰加訶子。堅痰除。除則嗽止。肺為水之上源。二者降火而兼行。痰加訶子。者以能斂肺而定痰喘也。不用治血之藥者。火退則血自止也。

龍腦雞蘇丸

方局

治肺有鬱熱咳嗽吐血衄血下

血。肺有鬱熱。故咳嗽甚則逼血上行。熱淋消渴。而吐衄。肺移熱於大腸則下血。熱淋消渴。肺熱則膀胱絕其化源。故淋。口臭。脾胃有熱。口苦。肝。肺熱則渴而多飲。為上消。口臭。脾胃有熱。口苦。肝。

有熱清心明目。

雞蘇葉

一名龍腦薄荷一兩六錢

生地

六錢

麥冬

四錢

蒲黃

阿

膠

木通

銀柴胡

二錢

甘草

半錢

黃耆

人參

一錢

先將木通柴胡浸二日熬汁地黃浸汁熬膏再用蜜三兩煉過和丸梧子大每服二十九細嚼湯下一方有黃連

肺本清肅或受心之邪燄或受肝之亢害故見諸證雞蘇輕揚升發瀉肺搜肝散熱理血故以爲君生地涼血炒蒲黃止血以療諸血柴胡平

在府胃也。
在經肺也。
裏熱藏府
也表熱太
陽也。

庚子七月

卷二

三

肝解肌熱木通利水降心火。麥冬阿膠潤燥清肺。參耆甘草瀉火和脾。此亦為熱而涉虛者設。

故少佐參耆也。

喻嘉言曰此九兩解氣分血分之熱。

犀角地黄湯

濟生

治傷寒胃火熱盛吐血衄血口

曰吐鼻血曰衄吐行濁道。衄行清道。喉與咽二管不同也。經者循經之血走而不守。隨氣而行。火氣急迫。故隨經直犯清道上。腦而出於鼻為衄。其從肺竅而出於咽者則為咳血咯血。其存胃中者為守營之血守而不走。胃虛不能攝血。或為火逼故嘔吐從咽而出也。吐血之熱在府。衄血之熱在經。難病衄血為表熱。嗽血便血熱於肺。則為裏熱。傷寒衄血為表熱。二畜血如狂。漱水下欲。咳衄寒便血為傳經熱邪。

嘔。瘀血在上焦則善忘。在下焦則如狂。漱水不
故雖漱水而不欲嚥。海藏曰。大凡血證皆不飲
水。惟氣證則飲水。經曰。陽明病口燥。漱水不欲
嚥者。必衄。傷寒當發汗而不發汗。及陽毒發斑
邪熱入裏。逼血妄行。故見諸證。
熱甚傷血。裏實表虛。發於皮膚。而為斑疹。傷寒
下早。熱毒乘虛入胃。則發斑。下遲。熱留胃中。亦
發斑。或服熱藥多。亦發斑。見紅點者為疹。如錦
紋者為斑。疹輕而斑重。色紫黑者。熱極而胃爛
也多死。凡斑疹慎不可汗。汗之重令開泄。
更增斑爛。亦不可遽下。恐斑毒內陷也。

生地

兩半

白芍

兩

犀角

其角尖尤良。鹿取茸。犀取尖。

者。多被蒸煮。丹皮半二錢。每服五錢。熱甚如狂。

者。不堪入藥。

者。加黃芩一兩。因怒致血者。加梔子。柴胡。黃芩。

者。加黃芩一兩。因怒致血者。加梔子。柴胡。黃芩。

者。加黃芩一兩。因怒致血者。加梔子。柴胡。黃芩。

者。加黃芩一兩。因怒致血者。加梔子。柴胡。黃芩。

者。加黃芩一兩。因怒致血者。加梔子。柴胡。黃芩。

者。加黃芩一兩。因怒致血者。加梔子。柴胡。黃芩。

者。加黃芩一兩。因怒致血者。加梔子。柴胡。黃芩。

者。加黃芩一兩。因怒致血者。加梔子。柴胡。黃芩。

中二焦之火。梔子瀉三焦之火。柴胡平少陽厥陰之火。

血屬陰本靜。因諸經火逼遂不安其位而妄行。

犀角大寒解胃熱而清心火。芍藥酸寒和陰血。

而瀉肝火。肝者心之母。丹皮苦寒瀉血中伏火。生地

大寒涼血而滋水。以其平諸經之僭逆也。海藏曰。血

分三部。藥有重輕。犀角地黃湯治上血。如吐血。之類。桃仁承氣湯治中血。如畜血中焦下痢膿

血之類。抵當湯丸治下血。如畜血如狂之類。又

曰。此證足太陰所主。脾不裹血。越而上行。實者

犀角地黃湯。虛者黃芩芍藥湯。凡病嘔吐血者。咸用芍藥主之。故知太陰藥也。醫貫曰。犀角地黃湯乃衄血之方。蓋犀水獸也。可以分水。可以通天。鼻衄之血。從任督而至顛頂。入鼻中。惟

犀能通頂而又下

犀角能下人腎水引地黃滋陰之品由腎脈而上故爲對證若陰虛火動吐血與咳嗽者皆可借用成功若陽虛勞嗽及脾胃虛者皆不宜活人書言瘀血入裏吐衄血者犀角地黃湯乃陽明聖藥如無犀角代以升麻二藥性味相遠何以爲代蓋以升麻能引諸藥同入陽明也朱二允曰升麻性升犀角性降用犀角止血乃借其下降之氣清心肝之火使血下行歸經爾僅誤用升麻血隨氣升不愈湧出不止乎傷寒汗出不微能通動經血誤發其汗亦動經血二者不同陶尚文治一人傷寒四五日吐血不止醫以犀角地黃湯茅花湯治之反劇陶切其脈浮數而緊遂用麻黃湯汗出而愈此取脈不取證也可謂得仲景心法矣設脈不浮緊而數其可用乎經曰傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之又曰太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈風寒在經鬱而爲熱不得汗解衄則熱隨血散俗名紅汗故愈若全未發汗致衄者仍須

用麻黃發之。成無已曰。傷寒。經者。為邪氣不得發散。雞甚於經。逼迫於血也。桂枝麻黃湯治經者。非治血也。即是發散經中邪氣。血鬱於上而吐血者。謂之薄厥。陷於下而瘀者。謂之畜血。此由太陽。隨經。瘀熱在裏。血為熱所搏。結於下焦。少腹當鞭。小便自利。

節菴加當歸紅花桔梗陳皮甘草藕汁名加味

犀角地黃湯當歸引血歸經藕汁涼血散瘀楮

以行下焦

歸脾湯

生濟

治思慮過度勞傷心脾怔忡健忘氣上

不足。下氣有餘。腸胃驚悸。有觸而心動。日驚。無實而心氣虛。故善忘。驚悸。驚而自動。日悸。即怔忡也。盜汗。汗為心液。心藏神而生血。心傷。發熱也。盜汗。則不能生血。而血少。故見前諸證。發熱。

脾主體倦脾主四肢食少脾不健運不眠血不歸經脾
肌肉骨倦傷故見或脾虛不能攝血致血妄行及婦人經
前諸證帶或心脾傷痛嗜臥肢體作痛大便不調或瘰
癧流注不能消散潰斂

黃耆

蜜炙

當歸

酒洗

龍眼肉

錢二

棗仁

炒

白朮

土炒

人

參

錢一

扶神

遠志

去心

木香

磨

甘草

炙五

分

薑

棗煎

醫貫曰心生血脾統血肝藏血凡治血證須按
三經用藥遠志棗仁補肝以生心火扶神補心

以生脾土參耆甘草補脾以固肺氣木香香先

入脾總欲使血歸脾爾治實火之血順氣為先

火之血養正為先氣壯則自能攝血。高鼓峯

曰心火衰甚不能生土以致土困金敗外兼咳嗽

吐痰寒熱往來盜汗急以此方去木香加白芍以治之凡見脾胃衰弱飲食不思大便泄瀉

總屬君火不旺所致此補本法也凡各種虛證

補中益氣所不效者投以此方如肺腎受傷再

加麥冬五味如肝腎受傷則芍藥更為有益如

從佛鬱而起則加柴胡丹皮山梔如非二陽之

病至怔忡則去木香加枸杞麥冬五味之屬如

夢遺則加熟地五味白芍牡蠣之屬如怔忡而

實挾包絡一種有餘之火兼痰者則加黃連生

地貝母之類以清之夢遺而挾相火者加黃蘗

知母麥冬以清之陽虛盜汗脈四至以內奄奄

不起惺惺不寐此方亦是對證要藥亦可變為

養營加減。○按歸脾湯乃有宋嚴用和所創以治二陽之病。發心脾內達志當歸乃薛新甫所加。以治血虛。又加丹皮山梔為加味。以治血熱。而陽生陰長之理。乃備隨手變化。通於各證。無不神應。曰歸脾者。從肝補心。從心補脾。率所生所藏而從所統。所謂隔二之治。蓋是血藥。非氣藥也。後人見薛氏得力。亦漫浪效。用之而不解其說。妄為加減。盡失其義。即有稍知者。亦止謂治血從脾。雜入溫中劫陰之藥。而嚴薛二家之旨益晦。四明高欽峯熟於趙氏之論。而獨悟其微。謂木香一味。本以噓血歸經。然以其香燥。反動肝火。而乾津液。故其用每去木香。而加芍藥。以追已散之真陰。且肺受火刑。白朮燥烈。恐助咳嗽。得芍藥以爲佐。則太陰爲養榮之用。又配合黃耆建中。龍性乃馴。唯脾虛泄瀉者。方留木香。以醒脾。脾虛挾寒者。方加桂附。以通真陰之陽。而外此皆出入於心肝脾三經。甘平清潤之藥。濟生之法。始無墮義矣。

去白朮木香龍眼加茯苓陳皮入蓮肉薑棗煎

名酸棗仁湯治虛煩不眠金匱酸棗仁湯亦治不眠見和解門

人參養營湯治脾虛食少無味身倦肌瘦肺虛

色枯氣短毛髮脫落小便赤澀營血不足驚悸

健忘寢汗發熱經曰脾氣散精上輸於肺此地下輸膀胱此天氣下降也脾肺虛則諸種虛證

上下不交而為否營血無所藉以生諸種虛證

亦治發汗過多身振脈搖筋惕肉瞤汗為心液汗即血也

汗過多則血液枯涸外無以榮養而然也

人參 白朮 白芍錢半 黃耆蜜炙 當歸錢二 茯苓錢一

熟地錢三甘草炙

陳皮

桂心

遠志分五

五味粒七

加薑棗煎

熟地歸芍養血之品參耆苓朮甘草陳皮補氣

之品血不足而補其氣此陽生則陰長之義也

且參耆五味所以補肺肺主氣氣血甘陳苓朮所

以健脾脾統血熟地所以滋腎腎藏精精血相生遠志能

通腎氣上達於心桂心能導諸藥入營生血五

臟交養互益故能統治諸病而其要則歸於養

營也薛立齋曰氣血兩虛而變現諸證莫能名狀勿論其病勿論其脈但用此湯諸證悉

退此十全大補對子也。十全大補但分氣血。此則五臟皆補。無乎不到。虛寒甚者。高氏常加附子以治之。三陰瘧更妙。

養心湯 治心虛血少神氣不寧怔忡驚悸心主

藏神。經曰。靜則神藏。躁則消亡。心虛則易動。故怔忡驚悸。不得安寧也。

黃耆炙 茯苓 茯神 當歸 川芎 半夏麩

一兩甘草炙 一柏子仁去油 棗仁 遠志去心 五味

人參 肉桂半錢 每服五錢

參耆以補心肺之氣肺為心之華蓋 芎歸以養心肝之

血肝木能生心火 二茯遠志以泄心熱 柏仁酸棗以寧

心神五味收神氣之散越半夏去擾心之痰涎
甘草補土以培心子赤桂引藥以入心經潤以
滋之溫以補之酸以收之香以舒之則心得其
養矣

還元水

治咳血吐血及產後血運陰虛久嗽火

蒸如燎

血生於心統於脾藏於肝宣布於肺靜則歸經熱則妄行火傷肺絡血隨咳出

或帶痰中

童便

取十一二歲無病童子不茹葷辛清徹

如水者去頭尾熱飲冬則用湯溫之或加藕汁

阿膠和服有痰稍加薑汁

童便鹹寒降火滋陰潤肺散瘀故治血證火嗽

血運如神北齊褚澄口疾不容物毫髮必咳血既滲入愈滲愈咳愈咳愈滲飲溲溺

百不一死服寒涼藥百不一生李時珍曰小便飲之入胃隨脾之氣上歸於肺下通水道而入

膀胱乃其舊路故能治肺病引火下行其味鹹而走血故治血病當熱飲熱則真氣尚存其行

自速冷則唯有鹹寒之性而已李士材曰煉成秋石真元之氣漸失不及童便遠矣。飲自己

輪酒名迴

獨聖散

治多年咳嗽肺痿咯血紅痰

白芨

為末每服二錢臨臥糯米湯下

人之五臟唯肺葉壞爛者可以復生。白芨苦辛收澁得秋金之令能補肺止血故治肺損紅痰又能蝕敗疽死肌為去腐生新之聖藥

清咽太平丸

治膈上有火早間咯血

肺屬金肅清之臟也

木火焚灼肺金受刑故咯血

兩頰常赤

肺肝之部

喉不清

十二經脈唯足太陽在表不歷膈咽餘皆上循喉嚨盡能作病而君相二火為

尤甚諸火上逆故咽喉不清

薄荷

兩十

防風

犀角

柿霜

甘草

兩二

桔梗

兩三

蜜丸

薄荷辛香升浮消風散熱清風故疏肝散熱故

防風血藥之使瀉肺搜肝防風瀉肺火散肝火

川芎血中氣藥升清散瘀柿霜生津潤肺犀角

凉心清肝甘草緩炎上之火勢桔梗載諸藥而

上浮又甘桔相合為清咽利膈之上劑也

小薊飲子治下焦結熱而成血淋其心主血小腸

搏血流入胞中與便俱出痛者為血淋不痛者為溺血蓋心熱者小腸必熱經所謂胞移熱於膀胱則癰溺血是也然熱必兼溼戴氏曰血鮮者心小腸實熱血瘀者腎膀胱虛冷準繩曰多有熱極而血凝黑者未可便以為冷也

小薊 蒲黃炒 藕節 滑石 木通 生地

梔子炒 淡竹葉 當歸 甘草稍分

小薊藕節退熱散瘀生地涼血蒲黃止血木通
降心肺之火下達小腸梔子散三焦鬱火由小
便出淡竹葉草清心而利小便心與小腸相為表裡滑石
瀉熱而滑竅當歸能引血歸經草梢能徑達莖
中也

復元羌活湯

湯名羌活而方內無之疑缺誤

治從高墜下惡血

畱於脇下疼痛不可忍者不問傷在何經惡血必畱於脇下以肝主

戊方切月血卷二下小薊飲子復元羌活湯

血故也。

柴胡

錢五

當歸

栝蒌根

穿山甲

炮

甘草

紅

花

錢二

桃仁

五十去皮尖研

大黃

一兩酒浸

每服

一兩

加酒

煎以利爲度

原文曰肝膽之經行於脇下屬厥陰少陽故以

柴胡引用爲君以當歸活血脈以甘草緩其急

爲臣以穿山甲花粉桃仁紅花破血潤血爲佐

以大黃蕩滌敗血爲使惡血去而痛自除矣。

補陰益氣煎

景岳

治勞倦傷陰精不化氣或陰精

內乏。以致外感。不解寒熱。痰癰陰虛。便結不通等證。

人參錢一熟地三五錢或一二兩當歸錢二三山藥酒炒二錢甘

草炙陳皮錢一柴胡一二錢如無升麻三五分浮於上不

用薑棗煎

此補中益氣湯之變方也。凡氣虛感邪者。宜補

中益氣湯。精虛感邪者。宜此張景岳曰補中益

之心法。蓋以脾胃屬土。為水穀之海。凡五臟生

成。唯此是賴者。在賴其發生之氣。運而上行。故

其氣皆然。凡春夏之土。能生能長者。以得陽氣

而上升。升則向生也。秋冬之土。不生不長者。以得陰氣而下降。降則向死也。今本方以升柴助升氣。以參耆歸木助陽氣。此東垣立方之意。誠盡善矣。第脾本象天。脾木象地。地天既交。所以成泰。然不知泰之前。猶有臨。臨之前。猶有復。此實三陽之元始。故子再製補陰益氣煎。正所以助臨復之氣。庶乎得復之本之道。而足補氣血之不足。

四生丸 治吐血衄血陽乘甚良。但陰血熱妄行。此方可暫用而已。

生荷葉 生艾葉 生地黃 生側柏葉 四

件爛搗丸如鷄子大。每服二丸。滾湯化。

統而論之。生之則寒。則四生皆能去火。析而論

之。則荷艾輕香。去火於氣。芩柏質實。瀉火於陰。

火去則血歸經而吐衄愈矣

當歸六黃湯

治陰虛有火盜汗發熱

心之所藏

血發於外為汗汗乃心之液藏府表裏之陽皆心主之以行其變化隨其陽氣所在之處而生津亦隨其火擾之處泄而為汗汗者心之陽寢者腎之陰陰虛睡熱陽必湊之故汗出也有火者謂有面赤口乾唇燥便赤音重脈數諸證

當歸

生地黃

熟地黃

黃芩

黃蘗

黃

連等黃耆

加倍

加麻黃根

本湯加麻黃根治盜汗甚捷蓋其性能行

周身肌表引諸藥至衛分而固腠理也

陰虛有火睡去則衛外之陽乘虛陷入陰中表

液失其固衛故濺濺然而汗出及覺則陽用事
衛氣復出於表表實而汗即止歸地所以養陰
芩連所以去火生地黃藥可以養陰亦可以去
火而倍用黃耆所以補衛固表也準繩曰陰虛陽必瘵故發熱盜汗宜當歸六黃湯加地骨皮陽虛陰必乘故發厥自汗宜黃耆建中湯甚者加附子或耆附湯有淫熱合邪汗出不休以風藥勝其淫甘藥泄其熱羌活勝濕湯有痰證冷汗自出宜理氣降痰痰去則汗自止有汗證用固瀉藥汗愈不收此可理心血汗乃心之液心失所養不能攝血故溢而為汗宜大補黃耆湯加棗仁有微熱者加石斛。士材曰六黃湯唯火實氣強者宜之不熱苦寒損胃耐弱深爾

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷二上

補養門

正方六十
附方二十七

八味地黃丸

十補丸

右歸丸

右歸飲

六味地黃

丸

知藥八味丸

八仙長壽丸

益陰

都氣丸

加減滋腎

生肝飲

滋陰腎氣丸

一人參補氣湯

加味地

黃丸

抑陰腎氣丸

九味地黃丸

疏肝益腎

湯肝飲

滋水

左歸丸

左歸飲

一陰煎

陰煎

三陰煎

四陰煎

五陰煎

七寶美髯

丹 大補元煎

滋陰大補丸

兒打老丸

五福飲

黑地黃丸

大營煎

小營煎

虎潛丸

補益丸
龍虎

濟陰丹

參朮膏

兩儀膏

天真丸

貞元飲

三

才封髓丹

三才湯
鳳髓丹

當歸地黃飲

人參固本丸

地黃醴

參乳丸

頓乳取
粉法

歸腎丸

天王補心丹

贊化血餘丹

孔聖枕中丹

養元粉

大補

陰丸

斑龍丸

又斑
龍丸

元武豆

龜鹿二仙丹

二

至丸

蟠桃菓

扶桑丸

羊肉湯

益氣聰明

湯

秦艽鼈甲散

黃耆鼈甲散

人參黃
耆散

秦艽扶

羸散

百合固金湯

補肺湯

補肺阿膠散

紫苑湯

王母桃

玉屏風散

黃耆湯
川芎湯

妙香散

參苓白朮散

休瘡飲

何人飲

四君子湯

見治

歸脾

湯

見理
血門

人參養營湯

見理
血門

十全大補湯

見治

八珍

湯

見治
氣門

生脈散

見消
暑門

當歸補血湯

見理
血門